

# 통넥신 (은교산) 캡슐

발열에 의한 염증성 질환

인후염, 기관지염

해열, 진통, 소염

초창, 중앙

10 캡슐

일반의약품

KGMP 적격업소



제조판매원 생약전문메이커

경진제약(주)

경기도 시흥시 괴량동 1-8

【원료약품의 분량】	금은화(약전) .....	710mg	면 교(약전) .....	710mg	박 해(약전) .....	426mg
1캡슐(610mg)중	길 경(약전) .....	426mg	감 초(약전) .....	426mg	담죽엽(생규) .....	284mg
	형 개(약전) .....	284mg	두 새(생규) .....	356mg	우방재(생규) .....	356mg
	영양각(생규) .....	22mg			상기 물 건조엑스	500mg

**【사용상의 주의사항】**

- 다음 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상담하십시오.
    - 몸이 허약한 환자
    - 위가 약한 환자
    - 혈압이 높은 환자 또는 고령자
    - 심장이나 신장에 장애가 있는 환자
    - 무릎이 있는 환자
    - 지금까지 약을 복용하면서 두드러기가 나거나, 피부가 붉어지거나, 가려움증 등을 일으킨 일이 있는 환자
    - 임신부나 임신 가능성이 있는 환자
    - 현재 의사의 치료를 받고 있는 환자
  - 사용할 때는 다음 사항에 주의하여 주십시오.
    - 정해진 용법과 용량을 철저히 지켜 주십시오.
    - 소아에게 복용시킬 때에는 보호자의 지도감독하에 복용시켜 주십시오.
    - 본 제품은 5세 미만의 병력이 어린이에게는 복용시키지 않아 주십시오.
  - 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항에 주의하여 주십시오.
    - 본 제품을 복용함으로써 두드러기가 나거나, 피부가 붉어지거나, 가려움증, 오심, 식욕부진, 위부불쾌감 등의 증상이 나타날 경우에는 복용을 중지하시고 의사 또는 약사와 상담하여 주십시오.
    - 본 제품을 복용함으로써 소변량이 줄어들거나, 연변이나 손발이 부어오르거나, 눈꺼풀이 무겁게 되거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 높아지거나, 두통 등의 증상이 나타날 경우에는 복용을 중지하시고 의사 또는 약사와 상담하여 주십시오.
    - 장기간 계속해서 사용할 경우에는 의사 또는 약사와 상담하여 주십시오.
  - 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의하여 주십시오.
    - 본체의 복용에 의해 노랑이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
  - 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 글리시리진산으로서 40mg 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 무중, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 관찰혈청 칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 인정 되는 경우 복용을 중지할 것.
    - 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타나는 경우가 있으므로 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
  - 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항에 주의하여 주십시오.
    - 칼륨함유제제, 갑초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제, 푸로세미드, 에타크린산 또는 체아지드계 이뇨제, 트리클로르메타이치드와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타날기 쉬우므로 신중히 투여할 것.
  - 보관 및 취급상의 주의사항
    - 소아가 만질 수 없는 장소에 보관하여 주십시오.
    - 직사광선을 피하여 되도록 습기가 없고 서늘한 장소에 보관하여 주십시오.
    - 남용하지 마시고 계속해서 품질을 유지할 수 있도록 별도의 용기에 옮겨서 보관하지 마십시오.
    - 본 제품을 사용할 때는 필요 주의사항 등이 기재되어 있으므로 상자에 붙여 주십시오.
- 개정일 : 2007년 8월 1일
- \* 본 의약품은 순수생약제제로서 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

【성 성】 갈색의 분말이 충전 된 상부 갈색, 하부 백색의 경질 캡슐제  
 【효능·효과】 두통, 감기로 인한 인후통, 입이 마르고, 기침  
 【용법·용량】 성인 1일 3회, 1회 2캡슐씩 식전 또는 식후 복용  
 【저 장 방 법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관  
 【포 장 단 위】 자사포장단위

분류번호 : 114



분리배출 8 806117 900965