

자연계열 논술고사 (오후)

1. 일반정보

유형	<input checked="" type="checkbox"/> 논술고사 <input type="checkbox"/> 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 / 문제 1	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학Ⅱ, 확률과 통계
	핵심개념 및 용어	조합을 이용한 경우의 수, 함수의 그래프, 함수의 증감
예상 소요 시간	40분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

문제 1 (20점)

공원에 서식하는 다람쥐의 개체수 N 을 예측하고자 한다. 먼저 공원 내 다람쥐 20마리를 잡아 표식을 부착한 뒤 풀어 주었다. 며칠 후 공원에서 임의로 잡은 25마리를 모아 표식을 확인하였다. 이때 3마리만 표식이 있을 확률을 $f(N)$ 이라고 하자.

위와 같은 사건이 일어나려면 다람쥐는 42마리 이상임을 알 수 있다. 즉 $N \geq 42$ 이다.

(1) 함수 $f(N)$ 을 구하시오.

(2) $g(N) = \frac{f(N+1)}{f(N)}$ 일 때, $g(N)$ 을 $\frac{N^2+cN+d}{N^2+aN+b}$ 의 형태로 구하시오.

(3) $f(N+1) > f(N)$ 을 만족하는 N 의 범위와 $f(N+1) < f(N)$ 을 만족하는 N 의 범위를 각각 구하시오.

(4) 위의 결과를 이용하여 $f(N)$ 이 최대가 되는 자연수 N 의 값을 구하고, 그 이유를 설명하시오.

3. 출제 의도

주어진 사건이 일어날 경우의 수와 확률을 계산할 수 있는지 평가한다. 또한 함수의 증감을 파악하여 확률이 최대가 되는 값을 구할 수 있는지 평가한다.

- (1) 조합을 이용하여 확률을 구할 수 있는지 평가한다.
- (2) 식을 정리하여 간단한 유리함수 형태로 변형할 수 있는지 평가한다.
- (3) 일차 부등식을 만족하는 변수의 범위를 찾을 수 있는지 평가한다.
- (4) 위의 결과를 바탕으로 함수의 증감을 파악하여 확률이 최대가 되는 자연수를 구할 수 있는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취 기준

제시문	과목명	교육과정 및 성취기준
	1	교육과정 성취기준
	평가준거 성취기준	[수학] -(5) 확률과 통계 - (가) 경우의 수 [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.(44쪽)
2	교육과정 성취기준	[수학] -(5) 확률과 통계 - Ⅲ 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다. (53쪽)
	평가준거 성취기준	[수학] -(5) 확률과 통계 - (나) 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.(44쪽)
3	교육과정 성취기준	[확률과 통계]- (2) 확률 - Ⅰ 확률의 뜻과 활용 [12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.(97쪽)
	평가준거 성취기준	[확률과 통계] - (2) 확률 - (가) 확률의 뜻과 활용 [12확통02-01-①] 통계적확률과 수학적확률의 의미를 이해할 수 있다.(154쪽)

		과목명	교육과정 및 성취기준
문항 (1)	1	교육과정 성취기준	[수학] - (4) 함수 - ㉠ 함수 [10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.(52쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] - (4) 함수 - (가) 함수 [10수학04-01] 함수의 개념을 이해하고, 그 그래프를 이해한다.(43쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - ㉠ 경우의 수 [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.(53쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - (가) 경우의 수 [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.(44쪽)
	3	교육과정 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - ㉡ 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다. (53쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - (나) 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.(44쪽)
	4	교육과정 성취기준	[확률과 통계] - (2) 확률 - ㉠ 확률의 뜻과 활용 [12확통02-01] 통계적 확률과 수학적 확률의 의미를 이해한다.(97쪽)
		평가준거 성취기준	[확률과 통계] - (2) 확률 - (가) 확률의 뜻과 활용 [12확통02-01-㉠] 통계적확률과 수학적확률의 의미를 이해할 수 있다.(154쪽)
문항 (2)	1	교육과정 성취기준	[수학] - (1) 문자와 식 - ㉠ 다항식의 연산 [10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.(48쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] - (1) 문자와 식 - (가) 다항식의 연산 [10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.(37쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학] -(5) 확률과 통계 - ㉡ 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다. (53쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] -(5) 확률과 통계 - (나) 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.(44쪽)

문항 (3)		과목명	교육과정 및 성취기준
	1	교육과정 성취기준	[수학] - (1) 문자와 식 - ㉑ 다항식의 연산 [10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.(48쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] - (1) 문자와 식 - (가) 다항식의 연산 [10수학01-01] 다항식의 사칙연산을 할 수 있다.(37쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학] - (1) 문자와 식 - ㉒ 여러 가지 방정식과 부등식 [10수학01-14] 미지수가 1개인 연립일차부등식을 풀 수 있다.(48쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] - (1) 문자와 식 - (바) 여러 가지 방정식과 부등식 [10수학01-14] 미지수가 1개인 연립일차부등식을 풀 수 있다.(39쪽)
	3	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2) 미분 - ㉓ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. (75쪽)
평가준거 성취기준		[수학Ⅱ] - (2) 미분 - (다) 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. (104쪽)	

문항 (4)		과목명	교육과정 및 성취기준
	1	교육과정 성취기준	[수학] - (1) 문자와 식 - ㉒ 여러 가지 방정식과 부등식 [10수학01-14] 미지수가 1개인 연립일차부등식을 풀 수 있다.(48쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] - (1) 문자와 식 - (바) 여러 가지 방정식과 부등식 [10수학01-14] 미지수가 1개인 연립일차부등식을 풀 수 있다.(39쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - ㉓ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. (75쪽)
평가준거 성취기준		[수학Ⅱ] - (2)미분 - (다) 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다. (104쪽)	

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	고성은 외	좋은책신사고	2018	83-85, 249-251, 257-259
	수학	류희찬 외	천재교과서	2018	83-86, 258-262, 268-272
	확률과 통계	박교식 외	동아출판	2019	43-45
	확률과 통계	김원경 외	비상교육	2019	53-56
	수학Ⅱ	고성은 외	좋은책신사고	2018	87-90
	수학Ⅱ	홍성복 외	지학사	2018	90-92

5. 문항 해설

(1) 전체 N 마리 중 25마리를 뽑는 모든 경우의 수는 ${}_N C_{25}$ 이다. 문제에 기술된 사건(뽑은 25마리 중 3마리는 표식이 있고 나머지는 표식이 없을 사건)의 경우의 수는 표식이 있는 20마리 중 3마리를 뽑고, 표식이 없는 $(N-20)$ 마리 중 22마리를 뽑는 경우의 수이므로 ${}_{20} C_3 \times {}_{N-20} C_{22}$ 이다. 구하는 확률은 두 경우의 수의 비이다.

(2) ${}_n C_r = \frac{n!}{r!(n-r)!}$ 을 이용하여 $g(N) = \frac{f(N+1)}{f(N)}$ 을 정리하면 간단한 2차 다항식의 비 $\frac{N^2+cN+d}{N^2+aN+b}$ 의 형태로 나타낼 수 있다.

(3) (2)에서 구한 $\frac{f(N+1)}{f(N)} = \frac{N^2-43N+456}{N^2-40N-41}$ 을 이용하여 주어진 두 개의 부등식 $f(N+1) > f(N)$ 과 $f(N+1) < f(N)$ 을 만족하는 N 의 범위를 각각 찾을 수 있다.

(4) (3)으로부터 자연수에서 정의된 함수 $f(N)$ 의 증감을 알 수 있고, $f(N)$ 이 최대가 되는 N 의 값을 구할 수 있다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	조합을 이용하여 확률을 N 에 대한 함수로 올바르게 표시 (7점)	7
(2)	문제에서 요구한 유리함수 형태로 $g(N)$ 을 표시 (3점)	3
(3)	N 의 범위를 각각 올바르게 구함 (5점) 두 개의 범위중 한 가지만 올바르게 구함 (2점)	5
(4)	$N=166$ 을 올바르게 구하고 이때 $f(N)$ 가 자연수 N 일 때 최대가 됨을 설명 (5점) $g(N) > 1$ 일 때 $f(N)$ 는 증가하며, $g(N) < 1$ 일 때 $f(N)$ 은 감소함을 판단 (2점) 일차부등식을 통한 풀이를 통해 $f(N)$ 의 증감을 올바르게 판단 (2점)	5

7. 예시 답안

(1)

총 경우의 수: ${}_N C_{25}$ (총 N 마리중 25마리를 순서 상관없이 뽑는 경우의 수)

문제의 사건이 일어날 경우의 수: ${}_{20} C_3 \times {}_{N-20} C_{22}$ (표식이 붙여진 20마리 중 3마리를 뽑을 경우의 수 \times 표식이 붙여지지 않은 $(N-20)$ 마리 중 $(25-3)$ 마리를 뽑을 경우의 수)

따라서 이 사건의 확률은

$$f(N) = \frac{{}_{20} C_3 \times {}_{N-20} C_{22}}{{}_N C_{25}} = \frac{20!}{3!(20-3)!} \frac{(N-20)!}{(22)!(N-20-22)!} = \frac{20!25!(N-20)!(N-25)!}{3!17!22!(N-42)!N!} = \frac{20!25!(N-20)!(N-25)!}{25!(N-25)!}$$

답안으로 가능한 다른 표현들

$$f(N) = \frac{{}_{20} C_3 \times {}_{N-20} C_{22}}{{}_N C_{25}}, f(N) = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 25 \times 24 \times 23 \times (N-20)!(N-25)!}{3!(N-42)!N!}$$

(2)

$$g(N) = \frac{{}_{20} C_3 \times {}_{N+1-20} C_{22}}{{}_{N+1} C_{25}} = \frac{20!25!(N+1-20)!(N+1-25)!}{3!17!22!(N+1-42)!(N+1)!} = \frac{(N-19)(N-24)}{(N-41)(N+1)} = \frac{N^2-43N+456}{N^2-40N-41}$$

(3) $42 \leq N$ 일 때, $f(N) > 0$ 이므로 $f(N+1) > f(N)$ 일 필요충분조건은

$$1 < \frac{f(N+1)}{f(N)} = \frac{N^2-43N+456}{N^2-40N-41} \text{ 즉, } N^2-43N+456 > N^2-40N-41 \text{ 이다.}$$

$$\text{따라서 } 3N < 497, N < \frac{497}{3} = 165.666... \text{ 이다.}$$

N 은 자연수이므로 $42 \leq N \leq 165$

마찬가지로 $f(N+1) < f(N)$ 일 필요충분조건은 $N > 165.666... \text{ 이다.}$

N 은 자연수 이므로 $N \geq 166$

(4) (3)으로부터 42이상의 자연수의 집합에서 정의된 함수 $f(N)$ 에 대해, $42 \leq N \leq 165$ 일 때 $f(N) < f(N+1)$ 이고, $N \geq 166$ 일 때 $f(N) > f(N+1)$ 이다.

즉, $f(42) < f(43) < \dots < f(165) < f(166) > f(167) > \dots$ 이므로 $N=166$ 일 때 $f(N)$ 은 최대가 된다.

9

자연계열 논술고사 (오후)


1. 일반정보

유형	<input checked="" type="checkbox"/> 논술고사 <input type="checkbox"/> 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 / 문제 2	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학Ⅱ, 미적분
	핵심개념 및 용어	다항함수, 함수의 개형, 미분, 이계도함수, 롤의 정리
예상 소요 시간	40분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

문제 2 (20점)

다음의 예는 함수 $g(x)$ 의 그래프와 함숫값의 부호를 나타낸 표이다. 방정식 $g(x) = 0$ 은 양의 실근 a, b, c, d 를 갖는다.



x	0	...	a	...	b	...	c	...	d	...
$g(x)$	$g(0)$	+	0	-	0	+	0	-	0	+

다음 롤의 정리에 따라, 위의 미분가능한 함수 $g(x)$ 에 대하여 a 와 b 사이에 $g'(x) = 0$ 의 양의 실근이 하나 이상 존재함을 알 수 있다.

<롤의 정리>

함수 $g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이고 열린구간 (a, b) 에서 미분가능할 때, $g(a) = g(b)$ 이면 $g'(c) = 0$ 인 c 가 열린구간 (a, b) 에 적어도 하나 존재한다.

실수 계수를 갖는 n 차 다항함수 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ 가 다음의 조건 (a)와 (b)를 만족한다.

(a) $a_n > 0, a_{n-1} \cdots a_1 a_0 \neq 0$

(b) 함수 $f(x), f'(x), f''(x)$ 의 그래프들은 x 축에 접하지 않는다.

이러한 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 세 방정식 $f(x) = 0, f'(x) = 0, f''(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수를 각각 k_0, k_1, k_2 라고 하자.

- (1) $a_0 > 0$ 이면 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수 k_0 가 짝수이고, $a_0 < 0$ 이면 k_0 가 홀수임을 위의 제시문에 주어진 것과 같은 표를 이용하여 설명하시오.
- (2) 롤의 정리를 이용하여 $k_0 \leq k_1 + 1$ 이 성립함을 설명하시오.
- (3) $n \geq 1$ 이고 a_0 와 a_1 의 부호가 같은 경우, $k_0 \leq k_1$ 이 성립함을 설명하시오.
- (4) $n \geq 2$ 이고 a_0, a_1, a_2 의 부호가 모두 같은 경우, $k_0 \leq k_2$ 이 성립함을 설명하시오.
- (5) 다항함수 $f(x) = x^4 + 2718x^3 - 2818x^2 - 3141x - 5926$ 는 제시문의 조건 (a)와 (b)를 만족한다. 위의 결과들을 이용하여 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수를 구하시오.

3. 출제 의도

다항식으로 주어진 방정식의 서로 다른 양의 실근의 개수에 관한 조건을 탐구하는 과정을 통하여, 롤의 정리 및 연속함수와 다항함수의 기본적인 특성을 이해하는지 평가하고, 해답을 유도하는 과정이 요구하는 수학적 사고력을 평가하고자 하였다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취 기준

		과목명	교육과정 및 성취기준
제시문	1	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2) 미분 - ㉔ 도함수 [12수학Ⅱ02-04] 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. (75쪽) [12수학Ⅱ02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다. (75쪽)
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (2) 미분 - (나) 도함수 [12수학Ⅱ02-04.05-①] 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.(103쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2) 미분 - ㉓ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-07] 함수에 대한 평균값 정리를 이해한다. (75쪽) [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다. (75쪽)
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (2) 미분 - (다) 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-07] 함수에 대한 평균값 정리를 이해한다. (104쪽) [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다. (104쪽)
	3	교육과정 성취기준	[미적분] - (2) 미분법 - ㉒ 여러 가지 미분법 [12미적02-10] 이계도함수를 구할 수 있다.(87쪽)
		평가준거 성취기준	[미적분] - (2)미분법 - (나) 여러 가지 미분법 [12미적02-10] 이계도함수를 구할 수 있다.(126쪽)
문항 (1)	1	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (1)함수의 극한과 연속 - ㉑ 함수의 극한 [12수학Ⅱ01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.(74쪽)
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (1) 함수의 극한과 연속 - (가) 함수의 극한 [12수학Ⅱ01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.(102쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (1)함수의 극한과 연속 - ㉒ 함수의 연속 [12수학Ⅱ01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.(74쪽)
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (1) 함수의 극한과 연속 - (나) 함수의 연속 [12수학Ⅱ01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.(102쪽)
	3	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - ㉓ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.(75쪽) [12수학Ⅱ02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.(75쪽) [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.(75쪽)
		평가준거 성취기준	

		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - (다) 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.(104쪽) [12수학Ⅱ02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.(104쪽) [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.(104쪽)
문항 (2)		과목명	교육과정 및 성취기준
	1	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ]- (2)미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-07] 함수에 대한 평균값 정리를 이해한다.(75쪽) [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.(75쪽)
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - (다) 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-07] 함수에 대한 평균값 정리를 이해한다. (104쪽) [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다. (104쪽)
문항 (3)		과목명	교육과정 및 성취기준
	1	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - ② 도함수 [12수학Ⅱ02-04] 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. (75쪽) [12수학Ⅱ02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.(75쪽)
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - (나) 도함수 [12수학Ⅱ02-04,05-①] 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.(103쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (1)함수의 극한과 연속 - ② 함수의 연속 [12수학Ⅱ01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.(74쪽)
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (1) 함수의 극한과 연속 - (나) 함수의 연속 [12수학Ⅱ01-04] 연속함수의 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.(102쪽)
	3	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - ③ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.(75쪽) [12수학Ⅱ02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.(75쪽) [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.(75쪽)
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - (다) 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.(104쪽) [12수학Ⅱ02-09] 함수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.(104쪽) [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.(104쪽)

문항 (4)		과목명	교육과정 및 성취기준	
	1	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - ㉔ 도함수 [12수학Ⅱ02-04] 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. (75쪽) [12수학Ⅱ02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.(75쪽)	
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - (나) 도함수 [12수학Ⅱ02-04,05-①] 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.(103쪽)	
	2	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - ㉓ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.(75쪽)	
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - (다) 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다. (104쪽)	
	3	교육과정 성취기준	[미적분] - (2)미분법 - ㉔ 여러 가지 미분법 [12미적02-10] 이계도함수를 구할 수 있다.(87쪽)	
		평가준거 성취기준	[미적분] - (2)미분법 - (나) 여러 가지 미분법 [12미적02-10] 이계도함수를 구할 수 있다.(126쪽)	
	문항 (5)		과목명	교육과정 및 성취기준
		1	교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - ㉔ 도함수 [12수학Ⅱ02-04] 함수 $y=x^n$ (n 은 양의 정수)의 도함수를 구할 수 있다. (75쪽) [12수학Ⅱ02-05] 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.(75쪽)
평가준거 성취기준			[수학Ⅱ] - (2)미분 - (나) 도함수 [12수학Ⅱ02-04,05-①] 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.(103쪽)	
2		교육과정 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - ㉓ 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.(75쪽)	
		평가준거 성취기준	[수학Ⅱ] - (2)미분 - (다) 도함수의 활용 [12수학Ⅱ02-10] 방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.(104쪽)	
3		교육과정 성취기준	[미적분] - (2)미분법 - ㉔ 여러 가지 미분법 [12미적02-10] 이계도함수를 구할 수 있다. (87쪽)	
		평가준거 성취기준	[미적분] - (2)미분법 -(나) 여러 가지 미분법 [12미적02-10] 이계도함수를 구할 수 있다. (126쪽)	

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	수학II	홍성복 외	지학사	2020	78-93
	수학II	고성은 외	좋은책신사고	2020	75-90
	미적분	황선옥 외	미래엔	2020	110-117
	미적분	김원경 외	비상교육	2020	90

5. 문항 해설

- (1) 최고차항의 계수가 양수인 다항함수 $f(x)$ 의 그래프의 개형과 제시문에 주어진 것과 같은 함숫값의 부호를 나타낸 표를 이용하면 $f(x)$ 의 상수항 a_0 의 부호가 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 홀수인지 짝수인지를 결정함을 알 수 있다.
- (2) 롤의 정리로부터 다항함수로 정의되는 방정식 $f(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근 사이에는 반드시 하나 이상의 $f'(x) = 0$ 의 양의 실근이 존재한다. 이로부터 문제의 부등식이 성립함을 알 수 있다.
- (3) $f'(x)$ 의 상수항이 a_1 이므로 문항 (1)의 결과로부터 a_0 와 a_1 의 부호가 같은 경우, $f(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수와 $f'(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수가 모두 홀수이거나 모두 짝수임을 알 수 있다. 문항 (2)에 주어진 부등식을 이용한다.
- (4) 방정식 $f(x) = 0$ 과 방정식 $f'(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수에 관한 문항 (3)의 결과를 방정식 $f'(x) = 0$ 과 방정식 $f''(x) = 0$ 에 적용한다.
- (5) 위의 문항 (4)의 결과를 적용하여, 주어진 4차 다항함수로부터 정의되는 방정식의 서로 다른 양의 실근의 개수가 만족하는 부등식을 얻고 문항 (1)의 결과를 이용한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	예시 답안의 표와 유사한 표를 그리고 정확한 논리 전개로 설명함 (5점)	5
(2)	서로 다른 양의 실근을 $0 < r_1 < r_2 < \dots < r_{k_0}$ 와 같이 표현하고, 롤의 정리를 적용하여 설명함 (3점)	3
(3)	문항 (1)의 결과를 이용하여 $k_0 \neq k_1 + 1$ 를 도출하고, 문항 (2)의 결과를 이용하여 설명함 (5점)	5
(4)	문항 (3)의 결과를 이용하여 설명함 (3점)	3
(5)	문항 (4)의 결과를 이용하여 $k_0 \leq k_2$ 를 도출하고, 문항 (1)의 결과를 이용하여 $k_0 = 1$ 를 구함 (4점)	4

7. 예시 답안

- (1) $f(x)$ 의 그래프가 x 축에 접하지 않으므로 근의 전후에서 $f(x)$ 의 값의 부호가 바뀐다. $f(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근을 $r_1 < r_2 < \dots < r_{k_0}$ 라 하면, $a_0 > 0$ 인 경우와 $a_0 < 0$ 인 경우의 제시문에 주어진 것과 같은 표는 각각 아래와 같다.

(a) $a_0 > 0$ 인 경우

x	0	...	r_1	...	r_2	r_{k_0}	...
$f(x)$	a_0	+	0	-	0	+	...	0	$(-1)^{k_0}$ 의 부호

(b) $a_0 < 0$ 인 경우

x	0	...	r_1	...	r_2	r_{k_0}	...
$f(x)$	a_0	-	0	+	0	-	...	0	$(-1)^{k_0+1}$ 의 부호

$f(x)$ 의 최고차항의 계수가 양수이므로, $r_{k_0} < x$ 인 x 의 구간에서 $f(x)$ 의 값의 부호는 +이어야 한다. 따라서, $a_0 > 0$ 일 때 $(-1)^{k_0}$ 의 부호가 +이어야 하므로 k_0 는 짝수이다. 마찬가지로 $a_0 < 0$ 일 때 $k_0 + 1$ 이 짝수이어야 하므로 k_0 는 홀수이다.

만약 $f(x) = 0$ 의 양의 실근이 존재하지 않는다면 즉, $k_0 = 0$ 이라면, 위와 같은 표의 $x > 0$ 구간 전체에서 함숫값의 부호가 +이어야 하므로 $a_0 > 0$ 이다. 따라서 이 경우도 (1)은 성립한다.

- (2) 항상 $k_1 \geq 0$ 이므로 $k_0 \leq 1$ 인 경우 주어진 부등식은 당연히 성립한다.

이제 $k_0 \geq 2$ 이라고 가정하고, $f(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근을 $r_1 < r_2 < \dots < r_{k_0}$ 라 하자.

각 $1 \leq i \leq k_0 - 1$ 에 대하여 롤의 정리에 의해 $r_i < s_i < r_{i+1}$ 인 $f'(x) = 0$ 의 양의 실근 s_i 이 존재한다.

즉, $r_1 < s_1 < r_2 < s_2 < r_3 < \dots < r_{k_0-1} < s_{k_0-1} < r_{k_0}$ 인 $f'(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근 $s_1, s_2, \dots, s_{k_0-1}$ 이 존재한다. 따라서 $k_1 \geq k_0 - 1$ 이 성립하므로 $k_0 \leq k_1 + 1$ 이다.

(3) 문항 (1)에 의해 $f(x)$ 의 상수항인 a_0 와 $f'(x)$ 의 상수항인 a_1 의 부호가 같은 경우, k_0 와 k_1 은 모두 짝수이거나 모두 홀수이다. 따라서 $k_0 \neq k_1 + 1$ 이다. 문항 (2)에 의해 $k_0 \leq k_1 + 1$ 이므로 $k_0 \leq k_1$ 이다.

(4) 문항 (3)에 의해 $k_0 \leq k_1$ 이다. $f'(x)$ 의 상수항인 a_1 과 $f''(x)$ 의 상수항인 $2a_2$ 의 부호가 같으므로 마찬가지로 문항 (3)에 의하여 $k_1 \leq k_2$ 이다. 따라서 $k_0 \leq k_1 \leq k_2$ 이므로 $k_0 \leq k_2$ 이다.

(5) 주어진 다항함수 $f(x)$ 는 a_0, a_1, a_2 의 부호가 모두 같다. 따라서, 문항 (4)의 결과에 의해 $k_0 \leq k_2$ 이다. 또한, $f''(x) = 4 \cdot 3 \cdot x^2 + 3 \cdot 2718 \cdot x - 2 \cdot 2818$ 이고 $f''(x) = 0$ 은 2차 방정식 이므로, $k_2 \leq 2$ 이다. 따라서, $k_0 \leq k_2 \leq 2$ 이다.

문항 (1)에 의해 $a_0 < 0$ 인 경우에 k_0 는 홀수이므로, $k_0 \leq 2$ 로부터 $k_0 = 1$ 임을 알 수 있다. 따라서, $f(x) = 0$ 의 서로 다른 양의 실근의 개수는 1이다.

10

자연계열 논술고사 (오후)


1. 일반정보

유형	<input checked="" type="checkbox"/> 논술고사 <input type="checkbox"/> 면접 및 구술고사	
전형명	논술전형	
해당 대학의 계열(과목) / 문항번호	자연계열 / 문제 3	
출제 범위	수학과 교육과정 과목명	수학, 수학 I, 확률과 통계, 미적분
	핵심개념 및 용어	삼각함수, 조합, 수열의 극한, 정적분과 급수
예상 소요 시간	40분 / 전체 120분	

2. 문항 및 제시문

문제 3 (20점)

반지름이 1인 원에 내접하는 정다각형들을 생각하자. 이러한 정 n 각형의 꼭짓점들을 시계바늘이 도는 방향과 반대인 방향의 순서대로 P_1, P_2, \dots, P_n 이라 하자.



정 n 각형의 두 꼭짓점을 잇는 선분들은 ${}_n C_2 = \frac{n(n-1)}{2}$ 개 있다. 이 선분들의 길이의 평균을 M_n 이라 하자. 가령 정사각형의 두 꼭짓점을 잇는 선분은 6개 있고 그 길이의 평균 M_4 는

아래와 같다.

$$M_4 = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} + \sqrt{2} + 2 + 2}{6} = \frac{2\sqrt{2} + 2}{3}$$

- (1) 정 n 각형의 꼭짓점 P_i, P_j 를 잇는 선분의 길이 $\overline{P_iP_j}$ 를 구하시오. (단, $1 \leq i < j \leq n$ 이다.)
- (2) 정 n 각형의 첫번째 꼭짓점과 다른 꼭짓점을 잇는 선분들의 길이 $\overline{P_1P_2}, \overline{P_1P_3}, \dots, \overline{P_1P_n}$ 의 평균을 L_n 이라 하자. $M_n = L_n$ 임을 설명하시오.
- (3) $\lim_{n \rightarrow \infty} M_n$ 의 값을 구하시오.
- (4) 정 $2n$ 각형의 꼭짓점들이 홀수번째 꼭짓점은 검은색으로, 짝수번째 꼭짓점은 흰색으로 칠해져 있다. 서로 같은 색 두 꼭짓점을 잇는 선분들의 개수와 서로 다른 색 두 꼭짓점을 잇는 선분들의 개수를 각각 구하시오.
- (5) 위 (4)의 정 $2n$ 각형에서 서로 같은 색 두 꼭짓점을 잇는 선분들의 길이의 평균을 F_n 이라 하고, 서로 다른 색 두 꼭짓점을 잇는 선분들의 길이의 평균을 G_n 이라 하자. $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n, \lim_{n \rightarrow \infty} G_n$ 의 값을 각각 구하시오.

3. 출제 의도

정다각형의 두 꼭짓점을 잇는 선분들의 길이와 그 평균에 대한 문제이다. 삼각함수의 기본 성질, 정적분과 급수의 관계, 경우의 수, 평균의 정의, 수열의 극한 등을 이해하고 적절히 응용할 수 있는지 평가한다.

- (1) 삼각함수를 이용하여 간단한 평면도형에서 선분의 길이를 구할 수 있는지 평가한다.
- (2) 평균의 정의와 정다각형의 대칭성을 이해하는지 평가한다.
- (3) 정적분과 급수의 관계로부터 급수의 극한을 구할 수 있는지 평가한다.
- (4) 간단한 경우의 수를 구할 수 있는지 평가한다.
- (5) 모집단을 나누었을 때, 각 집단의 평균과 전체의 평균과의 관계를 이해하는지 평가한다. 수열의 극한의 기본 성질을 이해하는지 평가한다.

4. 출제 근거

가) 교육과정 및 관련 성취 기준

		과목명	교육과정 및 성취기준
제시문	1	교육과정 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - ㉔ 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.(53쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - (나) 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.(44쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - ㉑ 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-01] 수열의 뜻을 안다. (65쪽)
		평가준거 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - (가) 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-01-①] 수열의 뜻을 알고, 일반항을 구할 수 있다. (81쪽)
	3	교육과정 성취기준	[확률과 통계] - (3) 통계 - ㉑ 확률분포 [12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다. (98쪽)
		평가준거 성취기준	[확률과 통계] - (3) 통계 - (가) 확률분포 [12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다. (155쪽)
문항 (1)	1	교육과정 성취기준	[수학 I] - (2) 삼각함수 - ㉑ 삼각함수 [12수학 I 02-01] 일반각과 호도법의 뜻을 안다.(64쪽) [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함 수의 그래프를 그릴 수 있다.(64쪽)
		평가준거 성취기준	[수학 I] - (2) 삼각함수 - (가) 삼각함수 [12수학 I 02-01-②] 호도법의 뜻을 알 수 있다.(80쪽) [12수학 I 02-02-①] 삼각함수의 뜻을 알고, 그 값을 구할 수 있다.(80쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - ㉑ 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-01] 수열의 뜻을 안다.(65쪽)
		평가준거 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - (가) 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-01-①] 수열의 뜻을 알고, 일반항을 구할 수 있다.(81쪽)

문항 (2)	과목명	교육과정 및 성취기준
	1	교육과정 성취기준
	평가준거 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - (나) 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.(44쪽)
2	교육과정 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - ㉑ 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-01] 수열의 뜻을 안다.(65쪽)
	평가준거 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - (가) 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-01-①] 수열의 뜻을 알고, 일반항을 구할 수 있다.(81쪽)
3	교육과정 성취기준	[확률과 통계] - (3) 통계 - ㉑ 확률분포 [12확통03-01] 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다.(98쪽) [12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다. (98쪽)
	평가준거 성취기준	[확률과 통계] - (3) 통계 - (가) 확률분포 [12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다. (155쪽)

문항 (3)	과목명	교육과정 및 성취기준
	1	교육과정 성취기준
	평가준거 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - (가) 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-01-①] 수열의 뜻을 알고, 일반항을 구할 수 있다.(81쪽)
2	교육과정 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - ㉒ 수열의 합 [12수학 I 03-04] \sum 의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.(65쪽)
	평가준거 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - (나) 수열의 합 [12수학 I 03-04] \sum 의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.(82쪽)
3	교육과정 성취기준	[미적분] - (1) 수열의 극한 - ㉑ 수열의 극한 [12미적01-01] 수열의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다.(85쪽)
	평가준거 성취기준	[미적분] - (1) 수열의 극한 - (가) 수열의 극한 [12미적01-01] 수열의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다. (124쪽)
4	교육과정 성취기준	[미적분] - (3) 적분법 - ㉑ 여러 가지 적분법 [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.(88쪽)
	평가준거 성취기준	[미적분] - (3) 적분법 - (가) 여러 가지 적분법 [12미적03-03-㉓] 삼각함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.(128쪽)

5	교육과정 성취기준	[미적분] - (3) 적분법 - ㉔ 정적분의 활용 [12미적03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.(88쪽)
	평가준거 성취기준	[미적분] - (3) 적분법 - (나) 정적분의 활용 [12미적03-04-①] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.(129쪽)

		과목명	교육과정 및 성취기준
문항 (4)	1	교육과정 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - ㉑ 경우의 수 [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.(53쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - (가) 경우의 수 [10수학05-01] 합의 법칙과 곱의 법칙을 이해하고, 이를 이용하여 경우의 수를 구할 수 있다.(44쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - ㉒ 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.(53쪽)
		평가준거 성취기준	[수학] - (5) 확률과 통계 - (나) 순열과 조합 [10수학05-03] 조합의 의미를 이해하고, 조합의 수를 구할 수 있다.(44쪽)
	3	교육과정 성취기준	[확률과 통계] - (2) 확률 - ㉑ 확률의 뜻과 활용 [12확통02-04] 여사건의 확률의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.(97쪽)
		평가준거 성취기준	[확률과 통계] - (2) 확률 - (가) 확률의 뜻과 활용 [12확통02-04] 여사건의 확률의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.(154쪽)

		과목명	교육과정 및 성취기준
문항 (5)	1	교육과정 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - ㉑ 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-01] 수열의 뜻을 안다.(65쪽)
		평가준거 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - (가) 등차수열과 등비수열 [12수학 I 03-01-①] 수열의 뜻을 알고, 일반항을 구할 수 있다.(81쪽)
	2	교육과정 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - ㉒ 수열의 합 [12수학 I 03-04] Σ 의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.(65쪽)
		평가준거 성취기준	[수학 I] - (3) 수열 - (나) 수열의 합 [12수학 I 03-04] Σ 의 뜻을 알고, 그 성질을 이해하고, 이를 활용할 수 있다.(82쪽)
	3	교육과정 성취기준	[미적분] - (1) 수열의 극한 - ㉑ 수열의 극한 [12미적01-01] 수열의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다.(85쪽) [12미적01-02] 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다.(85쪽)
		평가준거 성취기준	

	평가준거 성취기준	[미적분] - (1) 수열의 극한 - (가) 수열의 극한 [12미적01-01] 수열의 수렴, 발산의 뜻을 알고, 이를 판별할 수 있다. (124쪽) [12미적01-02] 수열의 극한에 대한 기본 성질을 이해하고, 이를 이용하여 극한값을 구할 수 있다.(124쪽)
4	교육과정 성취기준	[미적분] - (3) 적분법 - ㉠ 여러 가지 적분법 [12미적03-03] 여러 가지 함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.(88쪽)
	평가준거 성취기준	[미적분] - (3) 적분법 - (가) 여러 가지 적분법 [12미적03-03-㉢] 삼각함수의 부정적분과 정적분을 구할 수 있다.(128쪽)
5	교육과정 성취기준	[미적분] - (3) 적분법 - ㉡ 정적분의 활용 [12미적03-04] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해한다.(88쪽)
	평가준거 성취기준	[미적분] - (3) 적분법 - (나) 정적분의 활용 [12미적03-04-㉠] 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하고, 이를 활 용할 수 있다.(129쪽)
6	교육과정 성취기준	[확률과 통계] - (2) 확률 - ㉠ 확률의 뜻과 활용 [12확통02-04] 여사건의 확률의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.(97쪽)
	평가준거 성취기준	[확률과 통계] - (2) 확률 - (가) 확률의 뜻과 활용 [12확통02-04] 여사건의 확률의 뜻을 알고, 이를 활용할 수 있다.(154쪽)
7	교육과정 성취기준	[확률과 통계] - (3) 통계 - ㉠ 확률분포 [12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다.(98쪽)
	평가준거 성취기준	[확률과 통계] - (3) 통계 - (가) 확률분포 [12확통03-02] 이산확률변수의 기댓값(평균)과 표준편차를 구할 수 있다. (155쪽)

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행 연도	쪽수
고등학교 교과서	수학	류희찬 외	천재교과서	2018	258-262, 269
	수학	김원경 외	비상교육	2018	243-246, 254
	수학 I	김원경 외	비상교육	2018	81
	수학 I	류희찬 외	천재교과서	2018	92
	미적분	고성은 외	좋은책신사고	2019	69, 152
	미적분	이준열 외	천재교육	2019	166
	미적분	김원경 외	비상교육	2019	17
	미적분	황선욱 외	미래엔	2019	17
	확률과 통계	고성은 외	좋은책신사고	2019	84-87
	확률과 통계	김원경 외	비상교육	2019	77-80

5. 문항 해설

- (1) 정 n 각형의 인접한 두 꼭짓점 사이의 중심각은 $\frac{2\pi}{n}$ 이므로 i 번째, j 번째 꼭짓점 사이의 중심각을 구할 수 있다. 주어진 중심각을 가지는 부채꼴의 현의 길이를 삼각함수를 이용하여 구한다.
- (2) 한 꼭짓점 P_i 와 다른 꼭짓점을 이은 선분들의 길이의 평균은 각 $1 \leq i \leq n$ 에 대해 모두 동일한 값 L_n 이다. 이 n 개의 식을 모두 더하면 식의 한쪽 변에 임의의 두 꼭짓점을 잇는 선분은 두 번씩 나타난다. 이로부터 $M_n = L_n$ 을 얻을 수 있다.
- (3) (1)과 (2)에 의해 M_n 을 삼각함수의 적당한 급수로 나타낼 수 있다. 정적분과 급수와의 관계에 의해 $n \rightarrow \infty$ 일 때 이 급수의 극한은 삼각함수의 정적분과 같다.
- (4) 정 $2n$ 각형에서 검은색, 흰색 꼭짓점들은 각각 n 개 있다. 서로 다른 색 꼭짓점을 잇는 선분의 개수는 검은색 꼭짓점 중 하나, 흰색 꼭짓점 중 하나를 선택하는 경우의 수와 같고, 서로 같은 색 꼭짓점을 잇는 선분의 개수는 전체에서 이 개수를 빼서 얻을 수 있다.
- (5) 정 $2n$ 각형에서 검은색 꼭짓점들은 정 n 각형의 꼭짓점들이다. 따라서 정 $2n$ 각형에서 두 꼭짓점이 모두 검은색인 선분의 개수는 정 n 각형의 두 꼭짓점을 잇는 선분의 개수 $\frac{n(n-1)}{2}$ 이고, 그 길이의 평균은 M_n 이다. 두 꼭짓점이 모두 흰색인 선분의 개수와 길이의 평균도 마찬가지이다. 이로부터 $F_n = M_n$ 임을 알 수 있다.
 한편, (4)에서 구한 정 $2n$ 각형의 서로 같은 색 꼭짓점을 잇는 선분들, 서로 다른 색 두 꼭짓점을 잇는 선분들 각각의 개수로부터 M_{2n} 을 F_n 과 G_n 으로 나타낼 수 있다. 이로부터 G_n 의 극한값을 구한다.

6. 채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	답을 구하고 (그림 등을 이용하여) 설명함 (3점)	3
(2)	설명과 식의 전개가 논리적이고 정확함 (4점)	4
(3)	급수의 극한을 정적분으로 나타내어 극한을 구하였으며 식의 전개과정이 정확함 (4점)	4
(4)	같은 색, 다른 색 꼭짓점을 잇는 선분의 개수중 하나만 구함 (1점) 같은 색, 다른 색 꼭짓점을 잇는 선분의 개수 모두 구함 (3점)	3
(5)	$\lim_{n \rightarrow \infty} F_n$ 을 구하고 그 과정을 설명함 (3점) $\lim_{n \rightarrow \infty} G_n$ 을 구하고 그 과정을 설명함 (3점)	6

7. 예시 답안

(1) 정 n 각형의 인접한 두 꼭짓점 사이의 중심각은 $\frac{2\pi}{n}$ 이므로 i 번째, j 번째 꼭짓점 사이의 중심각은 $k = j - i$ 라 하면 $\frac{2\pi}{n}k$ ($1 \leq k \leq \frac{n}{2}$ 인 경우) 또는 $2\pi - \frac{2\pi}{n}k$ ($\frac{n}{2} \leq k \leq n-1$ 인 경우) 이다. 반지름 1인 원에서 중심각이 $0 \leq \theta \leq \pi$ 인 현의 길이는 $2\sin\frac{\theta}{2}$ 이며 중심각이 $2\pi - \theta$ 인 현 ($\pi \leq \theta \leq 2\pi$)의 길이 또한 $2\sin\frac{2\pi - \theta}{2} = 2\sin\left(\pi - \frac{\theta}{2}\right) = 2\sin\frac{\theta}{2}$ 이므로 i 번째, j 번째 꼭짓점 사이의 거리 $\overline{P_i P_j}$ 는 $2\sin\frac{\pi}{n}k$ 이다.

(2) 꼭짓점 P_i 와 다른 꼭짓점을 이은 선분들의 길이의 평균은 각 $1 \leq i \leq n$ 에 대해 모두 동일한 값 L_n 이다. 즉,

$$L_n = \frac{1}{n-1}(\overline{P_1 P_2} + \overline{P_1 P_3} + \dots + \overline{P_1 P_n}) \quad (P_1 \text{와 다른 꼭짓점을 이은 선분의 길이의 평균})$$

$$L_n = \frac{1}{n-1}(\overline{P_2 P_1} + \overline{P_2 P_3} + \dots + \overline{P_2 P_n}) \quad (P_2 \text{와 다른 꼭짓점을 이은 선분의 길이의 평균})$$

....

$$L_n = \frac{1}{n-1}(\overline{P_n P_1} + \overline{P_n P_2} + \dots + \overline{P_n P_{n-1}}) \quad (P_n \text{와 다른 꼭짓점을 이은 선분의 길이의 평균})$$

임의의 두 꼭짓점을 잇는 선분은 위의 n 개의 식의 우변에서 두 번씩 나타난다. 가령 꼭짓점 P_i, P_j 를 잇는 선분은 i 번째, j 번째 식의 우변에 한 번씩 나타난다. 따라서 위의 n 개의 식을 모두 더하면

$$\begin{aligned} n \times L_n &= \frac{1}{n-1} \times 2 \times (\text{모든 선분의 길이의 합}) \\ &= \frac{1}{n-1} \times 2 \times \frac{n(n-1)}{2} \times M_n = n \times M_n \end{aligned}$$

을 얻고, 따라서 $L_n = M_n$ 이다.

(3) (1)과 (2)에 의해

$$\begin{aligned} M_n = L_n &= \frac{1}{n-1}(\overline{P_1 P_2} + \overline{P_1 P_3} + \dots + \overline{P_1 P_n}) \\ &= \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^{n-1} 2\sin\left(\frac{\pi}{n}k\right) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2\sin\left(\frac{\pi}{n}k\right) \quad (\because \sin\left(\frac{\pi}{n}n\right) = 0) \end{aligned}$$

이고, $n \rightarrow \infty$ 일 때 극한을 취하면 정적분과 급수 사이의 관계에 의해 극한값은

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} M_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} \times \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 2\sin\left(\frac{\pi}{n}k\right) \\ &= 1 \times \int_0^1 2\sin \pi x \, dx = -\frac{2}{\pi} \cos \pi x \Big|_0^1 = \frac{4}{\pi} \end{aligned}$$

이다.

(4) 정 $2n$ 각형에서 검은색, 흰색 꼭짓점들은 각각 n 개 있다. 서로 다른 색 꼭짓점을 잇는 선분의 개수는 검은색 꼭짓점 중 하나, 흰색 꼭짓점 중 하나를 선택하는 경의의 수와 같으므로 $n \times n = n^2$ 이다. 서로 같은 색 꼭짓점을 잇는 선분의 개수는 전체에서 이 개수를 뺀 수이므로 ${}_{2n}C_2 - n^2 = \frac{2n(2n-1)}{2} - n^2 = n(n-1)$ 이다.

(5) 정 $2n$ 각형에서 검은색 꼭짓점들은 정 n 각형의 꼭짓점들이다. 따라서 정 $2n$ 각형에서 두 꼭짓점이 모두 검은색인 선분의 개수는 정 n 각형의 두 꼭짓점을 잇는 선분의 개수 $\frac{n(n-1)}{2}$ 이고, 그 길이의 평균은 M_n 이다. 두 꼭짓점이 모두 흰색인 선분의 개수와 길이의 평균도 마찬가지로이다. 따라서 같은 색 꼭짓점을 잇는 선분의 길이의 평균은 $F_n = \frac{1}{2}M_n + \frac{1}{2}M_n = M_n$ 이고 그 극한은 $\lim_{n \rightarrow \infty} F_n = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \frac{4}{\pi}$ 이다.

정 $2n$ 각형의 두 꼭짓점들을 잇는 선분들의 길이의 평균 M_{2n} 은 서로 같은색 꼭짓점을 잇는 선분들, 서로 다른색 두 꼭짓점을 잇는 선분들 각각의 개수와 길이의 평균으로부터

$$M_{2n} = \frac{n(n-1)}{2n(2n-1)/2} F_n + \frac{n^2}{2n(2n-1)/2} G_n = \frac{n-1}{2n-1} F_n + \frac{n}{2n-1} G_n$$

와 같이 쓸 수 있다. $n \rightarrow \infty$ 일 때 극한을 취하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} M_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} M_n = \frac{4}{\pi}$ 로부터

$$\frac{4}{\pi} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{\pi} + \frac{1}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} G_n, \text{ 즉, } \lim_{n \rightarrow \infty} G_n = \frac{4}{\pi} \text{ 이다.}$$