

# 임플란트 수술 전 후 주의사항

님

## ● 수술전

1. 수술 전 입안의 세균을 줄이기 위해 구강내·외 소독을 실시 하기 위해 화장은 안하시는 것이 좋습니다.
2. 수술 중 편안함과 마취제의 효과를 최대로 하기 위해 식사는 가볍게 하시고 수술시에는 편안한 옷으로 입으세요.
3. 수술 전 병원에서 처방한 약(항생제, 진통제 등)을 미리 복용하세요. 과거에 항생제 알레르기가 있었다면 치과의사에게 미리 말해야 합니다. 항생제는 경우에 따라서 수술 후 3~10일 동안 더 복용합니다.
4. 수술 하루 전에는 술과 담배를 삼가해 주십시오.

## ● 수술당일

1. 임플란트 시술 중 진동이나 혹은 소음을 느낄 수 있으나 정상적인 과정이므로 너무 걱정 마십시오.
2. 수술 당일 침이나 피를 뺀지 마시고 하루 동안 입안을 세계 행구시면 안됩니다.
3. 수술 부위는 첫 이틀 동안 얼음 찜질을 하십시오. (붓는 것은 대부분 피할 수 없으며 임플란트 수술 후 2~3일째가 가장 많이 붓고, 약 7일이 지나면 붓기는 대부분 빠지게 됩니다. 하지만 얼굴 피부에든 멍은 약 2주정도 남아 있을 수 있습니다. 붓기나 멍 또한 얼음 찜질을 수술 후 약 2일간 얼음 찜질을 시행함으로써 많이 예방 할 수 있습니다.)
4. 수술 후 7일간은 음주를 금하셔야 합니다. 수술후 3개월간 흡연을 삼가하시기 바랍니다. 음주와 흡연은 임플란트 조기실패의 원인이 됩니다.
5. 뜨거운 목욕이나 찜질 사우나 과격한 운동 등은 피하십시오.
6. 수술 후 일주일 동안은 딱딱하고 자극적인 음식을 피하시고 가급적 안정을 취하십시오.
7. 실밥은 대략 2주 후에 풀게 되오니, 수술부위에 자극이 가지 않게 해주시고 특히 손으로 만지지 않는 것이 좋습니다. 혹 실이 저절로 풀리게 되면 치과로 전화 주십시오.
8. 처방해 드린 약은 치과의사의 지시대로 복용하시기 바랍니다.
9. 식사 후에는 반드시 처방된 구강양치용액으로 입안을 행구십시오.
10. 수술 후 첫 날은 머리를 약간 높은 위치에 두고 자도록 하십시오.
11. 당분간 의사의 지시가 있을 때 까지 기존의 보철물을 사용하지 마십시오.
12. 수술 당일 귀가 시 운전은 삼가는 것이 좋으므로 택시를 이용하시거나 동반자와 같이 귀가 하십시오.
13. 그 외 출혈이나 통증이 계속될 경우는 반드시 치과로 전화 주십시오.

치과명 :

주 소 :

TEL :

FAX :