

• 2교시 수학 영역 •

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1. [출제의도] 지수법칙 계산하기

$$8^{-\frac{1}{2}} \div \sqrt{2} = (2^3)^{-\frac{1}{2}} \div 2^{\frac{1}{2}} = 2^{-\frac{3}{2}-\frac{1}{2}} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$$

2. [출제의도] 미분계수 이해하기

$f(x) = x^3 + x^2 - 5$ 라 하면  $f'(x) = 3x^2 + 2x$   
 곡선  $y = x^3 + x^2 - 5$  위의 점  $(1, -3)$ 에서의 접선의 기울기는  $f'(1) = 5$

3. [출제의도] 등차수열 이해하기


네 수 2, a, b, 14가 이 순서대로 등차수열을 이루므로  $a - 2 = 14 - b$   
 따라서  $a + b = 16$

4. [출제의도] 함수의 극한 이해하기

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 4 + 2 = 6$$

5. [출제의도] 삼각함수의 뜻과 그래프 이해하기

함수  $y = \tan x$ 의 그래프는 그림과 같다.



따라서  $0 < x < 5\pi$ 에서 함수  $y = \tan x$ 의 그래프와 직선  $y = 2$ 가 만나는 점의 개수는 5

6. [출제의도] 미분계수 이해하기

함수  $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로 함수  $f(x)$ 는  $x = 1$ 에서 미분가능하다.  
 그러므로 함수  $f(x)$ 는  $x = 1$ 에서 연속이다.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = f(1) \text{에서}$$

$$a + b + 1 = -3b - 1$$

$$a = -4b - 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(ax^2 + bx + 1) - (-3b - 1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{ax^2 + bx + 3b + 2}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(-4b - 2)x^2 + bx + 3b + 2}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x - 1)\{(-4b - 2)x - 3b - 2\}}{x - 1}$$

$$= -7b - 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(-3bx - 1) - (-3b - 1)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-3b(x - 1)}{x - 1} = -3b$$

함수  $f(x)$ 가  $x = 1$ 에서 미분가능하므로

$$-7b - 4 = -3b \text{에서 } b = -1, a = 2$$

따라서  $a + b = 1$

7. [출제의도] 부정적분 이해하기

$$f'(x) = 3x^2 - 6x \text{에서}$$

$$f(x) = \int (3x^2 - 6x) dx$$

$$= x^3 - 3x^2 + C \text{ (C는 적분상수)}$$

$$f(1) = 1 - 3 + C = 1 \text{에서 } C = 3$$

$$\text{그러므로 } f(x) = x^3 - 3x^2 + 3$$

$$f'(x) = 0 \text{에서 } x = 0 \text{ 또는 } x = 2$$

함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	...	0	...	2	...
f'(x)	+	0	-	0	+
f(x)	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수  $f(x)$ 의 극솟값은  $f(2) = -1$

8. [출제의도] 지수함수의 그래프를 활용하여 문제해결하기

함수  $y = \frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-m}$ 은  $x$ 의 값이 증가하면

$y$ 의 값이 감소하고, 함수  $y = 2^x + 1$ 은  $x$ 의 값이 증가하면  $y$ 의 값도 증가한다.

곡선  $y = 2^x + 1$ 은 점  $(0, 2)$ 를 지나므로

$$\text{곡선 } y = \frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-m} \text{이 곡선 } y = 2^x + 1 \text{과}$$

제1사분면에서 만나기 위해서는

$$\text{곡선 } y = \frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{x-m} \text{이 } y \text{축과 만나는 점의}$$

$y$ 좌표가 2보다 커야 한다.

$$\frac{1}{16} \times \left(\frac{1}{2}\right)^{0-m} > 2 \text{에서 } 2^{m-4} > 2, m > 5$$

따라서 자연수  $m$ 의 최솟값은 6

9. [출제의도] 삼각함수의 성질 이해하기

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cos \theta, \tan(\pi + \theta) = \tan \theta \text{이므로}$$

$$2\sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \sin \theta \times \tan(\pi + \theta) \text{에서}$$

$$2\cos \theta = \sin \theta \times \tan \theta$$

$$2\cos \theta = \sin \theta \times \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$2\cos^2 \theta = \sin^2 \theta$$

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1 \text{이므로 } 2(1 - \sin^2 \theta) = \sin^2 \theta$$

$$\text{따라서 } \sin^2 \theta = \frac{2}{3}$$

10. [출제의도] 정적분 이해하기

$$\int_0^2 f(t) dt = a \text{라 하면 } f(x) = x + a$$

$$a = \int_0^2 f(t) dt = \int_0^2 (t + a) dt$$

$$= \left[ \frac{1}{2}t^2 + at \right]_0^2 = 2 + 2a$$

에서  $a = -2$ 이므로  $f(x) = x - 2$

따라서  $f(3) = 1$

11. [출제의도] 등비수열 이해하기

등비수열  $\{a_n\}$ 의 공비를  $r (r > 0)$ 이라 하자.

$$a_4 + a_5 = 2(a_6 + a_7) + 3(a_8 + a_9) \text{에서}$$

$$a_1 r^3 + a_1 r^4 = 2(a_1 r^5 + a_1 r^6) + 3(a_1 r^7 + a_1 r^8)$$

$$a_1 r^3(1 + r) = 2a_1 r^5(1 + r) + 3a_1 r^7(1 + r)$$

$$3r^4 + 2r^2 - 1 = 0, (3r^2 - 1)(r^2 + 1) = 0$$

$$3r^2 - 1 = 0 \text{에서 } r^2 = \frac{1}{3}$$

$$a_3 = a_1 r^2 \text{이므로 } 6 = a_1 \times \frac{1}{3}$$

따라서  $a_1 = 18$

12. [출제의도] 곱의 미분법 이해하기

$g(x) = (x^2 - 2x)f(x)$ 의 양변을  $x$ 에 대하여 미분하면

$$g'(x) = (2x - 2)f(x) + (x^2 - 2x)f'(x)$$

$$g'(0) = -2f(0), g'(2) = 2f(2)$$

$$g'(0) + g'(2) = 2\{-f(0) + f(2)\} = 16$$

따라서  $f(2) - f(0) = 8$

13. [출제의도]  $\sum$ 의 성질 이해하기

$$\sum_{k=1}^{10} (3a_k + 1) = 3 \sum_{k=1}^{10} a_k + 10 = 40 \text{에서 } \sum_{k=1}^{10} a_k = 10$$

$$\sum_{k=1}^{10} b_k = \sum_{k=1}^{10} \{(a_k + b_k) - a_k\}$$

$$= \sum_{k=1}^{10} k - \sum_{k=1}^{10} a_k$$

$$= \frac{10 \times 11}{2} - 10 = 45$$

14. [출제의도] 거듭제곱근의 정의 이해하기

$m - 6$ 의 제곱근 중에서 실수인 것의 개수는

$m$ 의 값에 관계없이 1이므로  $f(3) = 1$

$$f(2) + f(3) + f(4) = 3 \text{에서 } f(2) + f(4) = 2$$

$m - 4$ 의 제곱근 중에서 실수인 것의 개수는

$m > 4$ 이면 2,  $m = 4$ 이면 1,  $m < 4$ 이면 0이다.

$m - 8$ 의 네제곱근 중에서 실수인 것의 개수는

$m > 8$ 이면 2,  $m = 8$ 이면 1,  $m < 8$ 이면 0이다.

$$f(2) = 0 \text{ 또는 } f(2) = 1 \text{이면 } f(4) = 0 \text{이므로}$$

$$f(2) + f(4) = 2 \text{이기 위해서는 } f(2) = 2, f(4) = 0$$

이어야 한다.

그러므로  $4 < m < 8$

따라서 구하는 모든 자연수  $m$ 의 값의 합은

$$5 + 6 + 7 = 18$$

15. [출제의도] 등비수열을 활용하여 문제해결하기

$$n = 1 \text{일 때, } a_1 + S_1 = 2a_1 = k \text{에서 } a_1 = \frac{k}{2}$$

$$n \geq 2 \text{일 때, } a_n = S_n - S_{n-1} \\ = (k - a_n) - (k - a_{n-1}) \\ = -a_n + a_{n-1}$$

$$\text{이므로 } a_n = \frac{1}{2} a_{n-1} (n \geq 2)$$

수열  $\{a_n\}$ 은 첫째항이  $\frac{k}{2}$ 이고 공비가  $\frac{1}{2}$ 인

$$\text{등비수열이므로 } a_6 = \frac{k}{2} \times \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{k}{64}$$

$$S_6 = 189 \text{이므로 } a_6 + S_6 = k \text{에서 } \frac{k}{64} + 189 = k$$

따라서  $k = 192$

16. [출제의도] 함수의 극한을 활용하여 문제해결하기

$$x < 0 \text{일 때, } \left| \frac{2}{x} - 3 \right| = -\frac{2}{x} + 3 > 3 \text{이므로}$$

$$x < 0 \text{에서 함수 } y = \left| \frac{2}{x} - 3 \right| \text{의 그래프와}$$

직선  $y = t (0 < t < 3)$ 은 만나지 않는다.

$$0 < x < \frac{2}{3} \text{일 때, } \left| \frac{2}{x} - 3 \right| = \frac{2}{x} - 3$$

$$\frac{2}{x} - 3 = t \text{에서 } x = \frac{2}{3+t}$$

$$x \geq \frac{2}{3} \text{ 일 때, } \left| \frac{2}{x} - 3 \right| = -\frac{2}{x} + 3$$

$$-\frac{2}{x} + 3 = t \text{ 에서 } x = \frac{2}{3-t}$$

$$\text{그러므로 } f(t) = \frac{2}{3-t} - \frac{2}{3+t} = \frac{4t}{(3-t)(3+t)}$$

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left\{ \frac{1}{t} \times \frac{4t}{(3-t)(3+t)} \right\}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{4}{(3-t)(3+t)} = \frac{4}{9}$$

17. [출제의도] 로그의 성질을 활용하여 문제해결하기

$$-4\log_a b = 54\log_b c = \log_c a = k \text{ 라 하면}$$

$$k^3 = -4\log_a b \times 54\log_b c \times \log_c a$$

$$= -\frac{4\log b}{\log a} \times \frac{54\log c}{\log b} \times \frac{\log a}{\log c}$$

$$= -216$$

$$\text{에서 } k = -6$$

$$b = a^{-\frac{k}{4}} = a^{\frac{3}{2}}, c = a^{\frac{1}{k}} = a^{-\frac{1}{6}}$$

$$\text{이므로 } b \times c = a^{\frac{3}{2}} \times a^{-\frac{1}{6}} = a^{\frac{4}{3}}$$

1이 아닌 자연수  $a$ 에 대하여  $a^{\frac{4}{3}}$ 의 값이 자연수가 되기 위해서는 어떤 자연수  $n(n > 1)$ 에 대하여  $a = n^3$ 이어야 한다.

$$a^{\frac{4}{3}} = (n^3)^{\frac{4}{3}} = n^4 \leq 300$$

에서 가능한 자연수  $n$ 의 값은 2, 3, 4뿐이다.

따라서 구하는 모든 자연수  $a$ 의 값의 합은

$$2^3 + 3^3 + 4^3 = 8 + 27 + 64 = 99$$

18. [출제의도] 사인법칙과 코사인법칙을 활용하여 문제해결하기

$$\overline{AB} = k \text{ 라 하면 } 2\overline{AB} = \overline{AC} \text{ 에서 } \overline{AC} = 2k$$

$$\text{점 M은 선분 AB의 중점이므로 } \overline{AM} = \frac{k}{2}$$

점 N은 선분 AC를 3:5로 내분하는 점이므로

$$\overline{AN} = 2k \times \frac{3}{8} = \frac{3}{4}k$$

$$\overline{MN} = \overline{AB} = k \text{ 이므로 삼각형 AMN에서}$$

코사인법칙에 의하여

$$\cos A = \frac{\left(\frac{k}{2}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}k\right)^2 - k^2}{2 \times \frac{k}{2} \times \frac{3}{4}k} = -\frac{1}{4}$$

$$\text{이므로 } \sin A = \sqrt{1 - \cos^2 A} = \frac{\sqrt{15}}{4}$$

삼각형 AMN의 외접원의 반지름의 길이를  $R$ 이라

$$\text{하면 } \pi R^2 = 16\pi \text{ 에서 } R = 4$$

삼각형 AMN에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{MN}}{\sin A} = 2R \text{ 에서 } \frac{k}{\frac{\sqrt{15}}{4}} = 8, k = 2\sqrt{15}$$

따라서 삼각형 ABC의 넓이는

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{AC} \times \sin A$$

$$= \frac{1}{2} \times 2\sqrt{15} \times 4\sqrt{15} \times \frac{\sqrt{15}}{4} = 15\sqrt{15}$$

19. [출제의도] 도함수를 이용하여 추론하기

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + k \text{ 에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$$

$$f'(x) = 0 \text{ 에서 } x = 1 \text{ 또는 } x = 3$$


함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

$x$	...	1	...	3	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	$k+4$	↘	$k$	↗

함수  $f(x)$ 는  $x=1$ 에서 극댓값  $k+4$ ,

$x=3$ 에서 극솟값  $k$ 를 갖는다.

함수  $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$a_n$ 은 직선  $y=3n$ 과 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가

만나는 점의 개수이므로

$$a_n = \begin{cases} 1 & (3n < k \text{ 또는 } 3n > k+4) \\ 2 & (3n = k \text{ 또는 } 3n = k+4) \\ 3 & (k < 3n < k+4) \end{cases}$$

어떠한 실수  $k$ 에 대해서도  $k=3m$ 과  $k+4=3l$ 을 동시에 만족시키는 두 정수  $m, l$ 은 존재하지 않으므로  $a_n=2$ 를 만족시키는 자연수  $n$ 의 개수는 1 이하이다.

또한 가능한  $a_n$ 의 값은 1, 2, 3뿐이므로

$$\sum_{n=1}^4 a_n = 7 \text{ 이기 위해서는 네 수 } a_1, a_2, a_3, a_4 \text{ 의}$$

값 중 1은 2개, 2는 1개, 3은 1개이어야 한다.

그러므로  $a_n=2$ 를 만족시키는  $n$ 의 개수는 1이다.

(i)  $k$ 의 값이 3, 6, 9, 12 중 하나인 경우

$$k=3 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^4 a_n = 2+3+1+1=7$$

$$k=6 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^4 a_n = 1+2+3+1=7$$

$$k=9 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^4 a_n = 1+1+2+3=7$$

$$k=12 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^4 a_n = 1+1+1+2=5 \neq 7$$

(ii)  $k+4$ 의 값이 3, 6, 9, 12 중 하나인 경우

$$k+4=3 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^4 a_n = 2+1+1+1=5 \neq 7$$

$$k+4=6 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^4 a_n = 3+2+1+1=7$$

$$k+4=9 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^4 a_n = 1+3+2+1=7$$

$$k+4=12 \text{ 일 때, } \sum_{n=1}^4 a_n = 1+1+3+2=7$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 모든 실수  $k$ 의 값의 합은  $(3+6+9)+(2+5+8)=33$

20. [출제의도] 도함수를 이용하여 추론하기

$$\text{ㄱ. } f(x) = x^3 - 11x^2 + 24x + 36 \text{ 에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 22x + 24 \text{ 이므로 } f'(0) = 24 \text{ (참)}$$

ㄴ. 두 점  $(0, 0), (6, f(6))$ 을 지나는

$$\text{직선의 기울기는 } \frac{f(6)}{6} = 0$$

$$f'(k) = \frac{f(6)}{6} = 0 \text{ 에서}$$

$$3k^2 - 22k + 24 = 0, (3k-4)(k-6) = 0$$

$$k = \frac{4}{3} \text{ 또는 } k = 6$$

$$\frac{4}{3} \text{ 와 } 6 \text{ 중 작은 값이 } \frac{4}{3} \text{ 이므로 } g(6) = \frac{4}{3} \text{ (참)}$$

ㄷ. 함수  $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면

$x$	...	$\frac{4}{3}$	...	6	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

양의 실수  $t$ 에 대하여 두 점  $(0, 0), (t, f(t))$ 를

지나는 직선의 기울기  $\frac{f(t)}{t}$ 는  $t=6$ 에서

최솟값 0을 갖는다.

또한 함수  $\frac{f(t)}{t}$ 는 양의 실수 전체의 집합에서

연속이고,  $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t)}{t} = \infty$ 이므로

$$\left\{ \frac{f(t)}{t} \mid t > 0 \right\} = \{y \mid y \geq 0\} \text{ 이다.}$$

한편  $f'(0) = 24$ 이므로

$$\frac{f(t)}{t} \geq 24 \text{ 이면 } f'(k) = \frac{f(t)}{t} \text{ 를 만족시키는}$$

양의 실수  $k$ 의 개수는 1이고,

$$0 \leq \frac{f(t)}{t} < 24 \text{ 이면 } f'(k) = \frac{f(t)}{t} \text{ 를 만족시키는}$$

양의 실수  $k$ 의 개수는 2이다.

$$\frac{f(t)}{t} = 24 \text{ 에서 } t^3 - 11t^2 + 36 = 0$$

$$(t-2)(t^2 - 9t - 18) = 0$$

$$t > 0 \text{ 이므로 } t = 2 \text{ 또는 } t = \frac{9+3\sqrt{17}}{2}$$


$$\text{이제 } \alpha = \frac{9+3\sqrt{17}}{2} \text{ 이라 하자.}$$

$f'(x) = 24$ 에서

$$3x^2 - 22x + 24 = 24, 3x\left(x - \frac{22}{3}\right) = 0$$

$$x = 0 \text{ 또는 } x = \frac{22}{3}$$

함수  $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



(i)  $0 < t \leq 2$  또는  $t \geq \alpha$ 일 때

$$\frac{f(t)}{t} \geq 24 \text{ 이므로 } f'(k) = \frac{f(t)}{t} \text{ 를 만족시키는}$$

양의 실수  $k$ 는 오직 1개 존재한다.

그  $k$ 의 값을  $k_1$ 이라 하면  $g(t) = k_1$ 이며

$k_1 \geq \frac{22}{3}$ 이다.

그러므로

$$\{g(t) \mid 0 < t \leq 2 \text{ 또는 } t \geq \alpha\} \subset \left\{k \mid k \geq \frac{22}{3}\right\} \quad \dots \textcircled{7}$$

또한  $k \geq \frac{22}{3}$ 인 실수  $k$ 에 대하여

$$f'(k) \geq 24 \text{이며 } f'(k) = \frac{f(t)}{t} \text{ 인}$$

두 양의 실수  $t_1, t_2 (0 < t_1 \leq 2, t_2 \geq \alpha)$ 가 존재한다.

$$\text{이때 } \frac{f(t_1)}{t_1} = f'(x) \text{ 를 만족시키는}$$

양의 실수  $x$ 의 값은  $k$ 뿐이므로  $g(t_1) = k$

그러므로

$$\left\{k \mid k \geq \frac{22}{3}\right\} \subset \{g(t) \mid 0 < t \leq 2 \text{ 또는 } t \geq \alpha\} \quad \dots \textcircled{8}$$

㉑, ㉒에 의하여

$$\left\{k \mid k \geq \frac{22}{3}\right\} = \{g(t) \mid 0 < t \leq 2 \text{ 또는 } t \geq \alpha\}$$

(ii)  $2 < t < 6$  또는  $6 < t < \alpha$ 일 때

$$0 < \frac{f(t)}{t} < 24 \text{ 이므로 } f'(k) = \frac{f(t)}{t} \text{ 를}$$

만족시키는 양의 실수  $k$ 가 2개 존재한다.

그  $k$ 의 값을  $k_2, k_3 (k_2 < k_3)$ 이라 하면

$$g(t) = k_2 \text{이며 } 0 < k_2 < \frac{4}{3} \text{ 이다.}$$

그러므로

$$\{g(t) \mid 2 < t < 6 \text{ 또는 } 6 < t < \alpha\} \subset \left\{k \mid 0 < k < \frac{4}{3}\right\} \quad \dots \textcircled{9}$$

또한  $0 < k < \frac{4}{3}$ 인 실수  $k$ 에 대하여

$$0 < f'(k) < 24 \text{ 이며 } f'(k) = \frac{f(t)}{t} \text{ 인}$$

두 양의 실수  $t_3, t_4 (2 < t_3 < 6 < t_4 < \alpha)$ 가 존재한다.

$$\text{이때 } \frac{f(t_3)}{t_3} = f'(x) \text{ 를 만족시키는}$$

양의 실수  $x$ 의 값은 2개이고, 그중  $k$ 가 아닌

$$\text{값을 } s \text{라 하면 } 6 < s < \frac{22}{3} \text{ 이므로 } g(t_3) = k$$

그러므로

$$\left\{k \mid 0 < k < \frac{4}{3}\right\} \subset \{g(t) \mid 2 < t < 6 \text{ 또는 } 6 < t < \alpha\} \quad \dots \textcircled{10}$$

㉑, ㉒에 의하여

$$\left\{k \mid 0 < k < \frac{4}{3}\right\} = \{g(t) \mid 2 < t < 6 \text{ 또는 } 6 < t < \alpha\}$$

(iii)  $t = 6$ 일 때

$$\text{ㄴ에 의하여 } g(6) = \frac{4}{3} \text{ 이므로 } \left\{\frac{4}{3}\right\} = \{g(t) \mid t = 6\}$$

(i), (ii), (iii)에 의하여 함수  $g(t)$ 의 치역은

$$\left\{k \mid 0 < k \leq \frac{4}{3} \text{ 또는 } k \geq \frac{22}{3}\right\}$$

그러므로 함수  $g(t)$ 의 치역의 원소가 아닌

모든 자연수의 합은  $2+3+4+5+6+7=27$  (참)

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ

### 21. [출제의도] 수열의 귀납적 정의를 이용하여 추론하기

조건 (나)에서

$a_n$ 이 홀수이고  $a_{n+1}$ 이 홀수이면  $a_{n+2}$ 는 짝수,

$a_n$ 이 홀수이고  $a_{n+1}$ 이 짝수이면  $a_{n+2}$ 는 홀수,

$a_n$ 이 짝수이고  $a_{n+1}$ 이 홀수이면  $a_{n+2}$ 는 홀수,

$a_n$ 이 짝수이고  $a_{n+1}$ 이 짝수이면  $a_{n+2}$ 는 짝수이다.

조건 (가)에서  $a_3$ 가 홀수이므로

$a_3$ 과  $a_4$  중 하나는 홀수, 다른 하나는 짝수이어야 한다.

(i)  $a_3$ 이 홀수이고  $a_4$ 가 짝수인 경우

$a_2$ 는 홀수이고  $a_1$ 은 짝수이다.

$a_1 = 2k, a_2 = 2l - 1 (k, l \text{ 은 자연수})$ 라 하면

조건 (나)에 의하여

$a_1 \times a_2$ 는 짝수이므로  $a_3 = 2k + 2l - 3,$

$a_2 \times a_3$ 은 홀수이므로  $a_4 = 2k + 4l - 4,$

$a_3 \times a_4$ 는 짝수이므로  $a_5 = 4k + 6l - 9$

$4k + 6l - 9 = 63$ 에서  $a_1 = 2k = 36 - 3l$

이므로 가능한  $a_1$ 의 값은 6, 12, 18, 24, 30이다.

(ii)  $a_3$ 이 짝수이고  $a_4$ 가 홀수인 경우

$a_2$ 는 홀수이고  $a_1$ 도 홀수이다.

$a_1 = 2p - 1, a_2 = 2q - 1 (p, q \text{ 는 자연수})$ 라 하면

조건 (나)에 의하여

$a_1 \times a_2$ 는 홀수이므로  $a_3 = 2p + 2q - 2,$

$a_2 \times a_3$ 은 짝수이므로  $a_4 = 2p + 4q - 5,$

$a_3 \times a_4$ 는 짝수이므로  $a_5 = 4p + 6q - 9$

$4p + 6q - 9 = 63$ 에서  $a_1 = 2p - 1 = 35 - 3q$

이므로 가능한  $a_1$ 의 값은 5, 11, 17, 23, 29이다.

(i), (ii)에 의하여  $a_1$ 의 최댓값은 30, 최솟값은 5

따라서  $M - m = 30 - 5 = 25$

### 22. [출제의도] 함수의 극한 계산하기

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x+1}-2} &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}{(\sqrt{x+1}-2)(\sqrt{x+1}+2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(\sqrt{x+1}+2)}{(x+1)-4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 3} (\sqrt{x+1}+2) = 4 \end{aligned}$$

### 23. [출제의도] 호도법 이해하기

부채꼴의 반지름의 길이를  $r$ 이라 하면

$$12\pi = r \times \frac{4}{5}\pi \text{ 이므로 } r = 12\pi \times \frac{5}{4\pi} = 15$$

### 24. [출제의도] 정적분을 활용하여 문제해결하기

$f(x) = x^3 + 2x^2 + 2$ 에서  $f'(x) = 3x^2 + 4x$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} \int_1^x f'(t) dt &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x-1} \\ &= f'(1) = 7 \end{aligned}$$

### 25. [출제의도] 로그함수를 활용하여 문제해결하기

$$\log_x 16 = \frac{4}{\log_2 x} \text{ 이므로}$$

$$\log_2 x - 3 = \log_x 16 \text{ 에서 } \log_2 x - 3 = \frac{4}{\log_2 x}$$

$$(\log_2 x)^2 - 3\log_2 x - 4 = 0$$

$$(\log_2 x - 4)(\log_2 x + 1) = 0$$

$$\log_2 x = 4 \text{ 또는 } \log_2 x = -1$$

$$\log_2 x = 4 \text{ 에서 } x = 16, \log_2 x = -1 \text{ 에서 } x = \frac{1}{2}$$

따라서 구하는 모든 실수  $x$ 의 값의 곱은 8

### 26. [출제의도] 도함수를 활용하여 문제해결하기

두 점 P, Q의 시각  $t (t > 0)$ 에서의 속도를 각각

$v_1(t), v_2(t)$ 라 하면

$$v_1(t) = 3t^2 - 6t - 24, v_2(t) = 2t - a$$

$$v_1(t) = 3(t+2)(t-4) = 0 \text{ 에서 } t = 4$$

$$0 < t < 4 \text{ 에서 } v_1(t) < 0, t > 4 \text{ 에서 } v_1(t) > 0$$

이므로 점 P의 운동 방향은 시각  $t = 4$ 에서만 바뀐다.

또한 두 점 P, Q의 운동 방향이 동시에 바뀌므로

점 Q의 운동 방향도 시각  $t = 4$ 에서 바뀌어야 한다.

$$v_2(4) = 8 - a = 0 \text{ 에서 } a = 8$$

$$\text{따라서 } a + k = 8 + 4 = 12$$

### 27. [출제의도] 등차수열 이해하기

구하는 수열  $\{a_n\}$ 의 공차가 자연수이므로  $d > 0$

조건 (가)에서

$$a_1 + 7d = 2(a_1 + 4d) + 10, a_1 = -d - 10 < 0$$

모든 자연수  $n$ 에 대하여  $a_n < a_{n+1}$ 이므로

$a_n < 0$ 을 만족시키는 자연수  $n$ 의 최댓값을

$k$ 라 하면  $a_{k+1} \geq 0$

그러므로  $a_k \times a_{k+1} \leq 0$

그런데 조건 (나)에서  $a_k \times a_{k+1} \geq 0$ 이므로

$$a_{k+1} = 0$$

$$a_{k+1} = (-d - 10) + kd = 0 \text{ 에서 } k = \frac{10}{d} + 1$$

$k$ 가 자연수이므로  $d$ 는 10의 약수이다.

따라서 구하는 모든 자연수  $d$ 의 값의 합은

$$1 + 2 + 5 + 10 = 18$$

### 28. [출제의도] 함수의 극한을 이용하여 추론하기

조건 (가)에서 함수  $\{f(x)\}^2 g(x)$ 의 차수가 5이므로

두 함수  $f(x), g(x)$ 는 아래의 경우 중 하나이다.

(i)  $f(x)$ : 상수함수,  $g(x)$ : 오차함수

(ii)  $f(x)$ : 일차함수,  $g(x)$ : 삼차함수

(iii)  $f(x)$ : 이차함수,  $g(x)$ : 일차함수

$$\text{조건 (나)에서 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = 2 \text{ 이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^5 = 0 \text{ 이므로 } \lim_{x \rightarrow 0} f(x)\{g(x)\}^2 = 0$$

그러므로 어떤 다항함수  $h(x)$ 에 대하여

$$f(x)\{g(x)\}^2 = x^k h(x) \text{ (단, } k \text{ 는 자연수, } h(0) \neq 0 \text{)}$$

이때

$$k < 5 \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} \text{의 값이 존재하지 않고}$$

$$k > 5 \text{ 이면 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} = 0 \neq 2 \text{ 이므로 } k = 5$$

그러므로  $f(x)\{g(x)\}^2 = x^5 h(x) (h(0) \neq 0) \quad \dots \textcircled{1}$

(i)  $f(x)$ : 상수함수,  $g(x)$ : 오차함수인 경우

다항식  $f(x)\{g(x)\}^2$ 에서 오직  $g(x)$ 만이  $x$ 를

인수로 가지므로 ㉑을 만족시키지 않는다.

(ii)  $f(x)$ : 일차함수,  $g(x)$ : 삼차함수인 경우

㉑을 만족시키기 위해서는

$$f(x) = ax, g(x) = x^2(bx + c)$$

(단,  $a, b, c$ 는 음이 아닌 정수,  $a \neq 0, b \neq 0$ )

(iii)  $f(x)$ : 이차함수,  $g(x)$ : 일차함수인 경우

다항식  $f(x)\{g(x)\}^2$ 의 차수가 4이므로 ㉑을

만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 두 함수  $f(x), g(x)$ 는

$$f(x) = ax, g(x) = x^2(bx + c)$$

(단,  $a, b, c$ 는 음이 아닌 정수,  $a \neq 0, b \neq 0$ )

조건 (가)에서

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 g(x)}{x^5} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a^2 x^4 (bx + c)}{x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( a^2 b + \frac{a^2 c}{x} \right) \\ &= a^2 b = 4 \end{aligned}$$

조건 (나)에서

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^5} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^5(bx+c)^2}{x^5} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} a(bx+c)^2 \\ &= ac^2 = 2\end{aligned}$$

$a^2b=4$ ,  $ac^2=2$ 를 만족시키는 음이 아닌 세 정수  $a, b, c$ 는  $a=2, b=1, c=1$

그러므로  $f(x)=2x, g(x)=x^2(x+1)$

따라서  $f(2)+g(2)=4+4 \times 3=16$

29. [출제의도] 삼각함수의 그래프를 이용하여 추론하기


$\frac{\pi}{2} \leq x \leq a$ 인  $x$ 에 대하여

$$\frac{3}{2}\pi + b \leq 3x + b \leq 3a + b \text{ 이므로}$$

단원구간  $\left[\frac{\pi}{2}, a\right]$ 에서 함수  $f(x)=2\cos(3x+b)$ 의 최댓값, 최솟값은 각각

단원구간  $\left[\frac{3}{2}\pi + b, 3a + b\right]$ 에서 함수  $y=2\cos x$ 의 최댓값, 최솟값과 같다.

함수  $y=2\cos x$ 의 그래프는 그림과 같다.



$0 \leq b \leq \pi$ 인  $b$ 에 대하여

$$\frac{3}{2}\pi \leq \frac{3}{2}\pi + b \leq \frac{5}{2}\pi \text{ 이므로}$$

단원구간  $\left[\frac{3}{2}\pi + b, 3a + b\right]$ 에서 함수  $y=2\cos x$ 의 최댓값이 1, 최솟값이  $-\sqrt{3}$ 이 되도록 하는  $a, b$ 는

$$2\pi < \frac{3}{2}\pi + b < \frac{5}{2}\pi, \quad \frac{5}{2}\pi < 3a + b < 3\pi \text{ 를}$$

만족시켜야 한다.

단원구간  $\left[\frac{3}{2}\pi + b, 3a + b\right]$ 에서 함수  $y=2\cos x$ 는

$x$ 의 값이 증가하면  $y$ 의 값은 감소하므로

단원구간  $\left[\frac{3}{2}\pi + b, 3a + b\right]$ 에서

함수  $y=2\cos x$ 의 최댓값은  $2\cos\left(\frac{3}{2}\pi + b\right)$ ,

최솟값은  $2\cos(3a + b)$ 이다.

$$2\cos\left(\frac{3}{2}\pi + b\right) = 1 \text{ 에서 } \frac{3}{2}\pi + b = \frac{7}{3}\pi, \quad b = \frac{5}{6}\pi$$

$$2\cos(3a + b) = -\sqrt{3} \text{ 에서 } 3a + b = \frac{17}{6}\pi, \quad a = \frac{2}{3}\pi$$

$$a \times b = \frac{2}{3}\pi \times \frac{5}{6}\pi = \frac{5}{9}\pi^2$$

따라서  $p=9, q=5$ 이며  $p+q=14$

30. [출제의도] 정적분을 이용하여 추론하기

$F(x) = \int_0^x f(t)dt$ 라 하면

$F(x)$ 는 최고차항의 계수가 양수인 사차함수이다.

$$g(x) = \begin{cases} F(x) - 4 & (x < 2) \\ -F(x) + 4 & (x \geq 2) \end{cases}$$

조건 (가)에서

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{g(x) - 4}{x - 2} = g'(0) \text{ 이고 } \lim_{x \rightarrow 2^-} (x - 2) = 0 \text{ 이므로}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \{g(x) - 4\} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \{F(x) - 8\} = F(2) - 8 = 0$$

그러므로  $F(2) = 8 \dots \textcircled{1}$

또한

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{g(x) - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{F(x) - 8}{x - 2} = F'(2) = f(2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{g(x) + 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{-\{F(x) - 8\}}{x - 2} = -F'(2) = -f(2)$$

$$g'(0) = F'(0) = f(0)$$

조건 (가)에 의하여  $f(2) = -f(2) = f(0)$ 에서

$$f(2) = f(0) = 0$$

$$f(x) = ax(x-2)(x-b) \quad (a, b \text{는 상수, } a > 0)$$


$$f(x) = a\{x^3 - (b+2)x^2 + 2bx\}$$

$$f'(x) = a\{3x^2 - 2(b+2)x + 2b\}$$

$$f'(2) = a(-2b+4) < 0 \text{ 에서}$$

$$a > 0 \text{ 이므로 } -2b+4 < 0, \quad b > 2$$

함수  $y=f(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$$g'(x) = \begin{cases} f(x) & (x < 2) \\ -f(x) & (x > 2) \end{cases}$$

$f(x) = ax(x-2)(x-b)$  ( $a > 0, b > 2$ )에 대하여

함수  $g(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면


$x$	$\dots$	0	$\dots$	2	$\dots$	$b$	$\dots$
$f(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$g'(x)$	-	0	+		+	0	-
$g(x)$	$\searrow$	-4	$\nearrow$		$\nearrow$	$g(b)$	$\searrow$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 4, \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = g(2) = -4$$

조건 (나)에 의하여 함수  $y=g(x)$ 의 그래프와

직선  $y=4$ 가 두 점에서 만나야 하므로  $g(b)=4$

함수  $y=g(x)$ 의 그래프는 그림과 같다.



$$g(b) = -\int_0^b f(t)dt + 4 = 4 \text{ 에서 } \int_0^b f(t)dt = 0$$

$$\int_0^b at(t-2)(t-b)dt$$

$$= \int_0^b a\{t^3 - (b+2)t^2 + 2bt\}dt$$

$$= a\left[\frac{1}{4}t^4 - \frac{b+2}{3}t^3 + bt^2\right]_0^b$$

$$= a\left(\frac{b^4}{4} - \frac{b+2}{3} \times b^3 + b^3\right)$$

$$= ab^3\left(\frac{b}{4} - \frac{b+2}{3} + 1\right) = 0$$

$$3b - 4(b+2) + 12 = 0 \text{ 에서 } b = 4$$

$$\textcircled{1} \text{ 에 의하여 } \int_0^2 f(t)dt = 8$$

$$\int_0^2 f(t)dt = \int_0^2 at(t-2)(t-4)dt$$

$$= a\left[\frac{1}{4}t^4 - 2t^3 + 4t^2\right]_0^2$$

$$= 4a = 8$$

에서  $a=2$ 이므로  $f(x)=2x(x-2)(x-4)$

따라서  $f(5)=30$