

/ 출 / 제 / 문 / 제 /

문제 1

다음 제시문을 읽고 아래 논제에 답하시오. (30점)

함수 $f(x)$ 가 임의의 세 실수 a, b, c 를 포함하는 구간에서 연속일 때

$$\int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

[출처 : 수학 II 「부정적분과 정적분」]

주기가 1인 주기함수 $f(x)$ 는 $0 \leq x \leq 1$ 에서 $f(x) = a - |2x - 1|$ 이다. 함수 $g(x)$ 를 다음과 같이 정의하자. ($[x]$ 는 x 를 넘지 않는 최대의 정수이다.)

$$g(x) = \frac{f(x)}{[x+1][x+2]} \quad (x \geq 0)$$

다음 문항에 답하시오.

- (1) 임의의 자연수 k 에 대하여, 함수 $g(x)$ 가 $x = k$ 에서 연속이 되도록 상수 a 의 값을 정하시오.
- (2) 문항 (1)에서 구한 상수 a 에 대하여, n 이 자연수일 때 $\int_0^n g(x) |\sin \pi x| dx$ 를 n 의 식으로 나타내시오.

문제 2

다음 제시문을 읽고 아래 논제에 답하시오. (20점)

두 함수 $f(x), g(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속일 때, 두 곡선 $y = f(x), y = g(x)$ 및 두 직선 $x = a, x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이 S 는

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

[출처 : 수학 II 「정적분의 활용」]

곡선 $C: y = x^3 + ax$ 위의 점 P 에서의 접선 ℓ 과 곡선 C 가 만나는 다른 점을 Q 라고 하자. 선분 PQ 의 중점 R 의 x 좌표를 b 라고 할 때, 다음 문항에 답하시오.

- (1) 점 P 와 점 Q 의 x 좌표를 각각 b 의 식으로 나타내시오.
- (2) 곡선 C 와 선분 PR 및 직선 $x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 K , 곡선 C 와 선분 QR 및 직선 $x = b$ 로 둘러싸인 도형의 넓이를 L 이라 할 때, 극한값 $\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{K}{L}$ 을 구하시오.

문제 3

다음 제시문을 읽고 아래 논제에 답하시오. (30점)

(가) 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이면

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

[출처 : 확률과 통계 「확률의 뜻과 활용」]

(나) 두 사건 A, B 가 동시에 일어날 확률은

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B) \quad (\text{단, } P(A) > 0, P(B) > 0)$$

[출처 : 확률과 통계 「조건부확률」]

흰 구슬 2개, 검은 구슬 3개가 들어 있는 주머니에서 흰 구슬이 모두 나올 때까지 구슬을 임의로 1개씩 꺼낸다고 하자. (단, 꺼낸 구슬은 다시 넣지 않는다.) 꺼낸 구슬의 총 개수를 확률변수 X 라고 할 때, 다음 문항에 답하시오.

- (1) 확률 $P(X=5)$ 를 구하시오.
- (2) 기댓값 $E(X)$ 를 구하시오.
- (3) 흰 구슬 2개, 검은 구슬 n 개가 들어 있는 주머니에서 흰 구슬이 모두 나올 때까지 구슬을 임의로 1개씩 꺼낸다고 하자. (단, 꺼낸 구슬은 다시 넣지 않는다.) 꺼낸 구슬의 총 개수를 확률변수 Y 라고 할 때, 기댓값 $E(Y)$ 를 n 의 식으로 나타내시오.

문제 4

다음 제시문을 읽고 아래 논제에 답하시오. (20점)

함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[a, b]$ 에서 연속이면 최대·최소 정리에 의하여 함수 $f(x)$ 는 최댓값과 최솟값을 갖는다. 최댓값은 이 구간에서 함수의 극댓값, $f(a), f(b)$ 중 가장 큰 값이고, 최솟값은 극솟값, $f(a), f(b)$ 중에서 가장 작은 값이다.

[출처 : 수학 II 「도함수의 활용」]

곡선 $C: x^2 + y = 6$ 과 직선 $l: 2x + y = 6$ 으로 둘러싸인 도형을 S 라고 하자. 도형 T 는 실수 a 에 대하여 다음 조건을 모두 만족하는 직사각형 중 넓이가 가장 큰 직사각형이다.

- (i) S 의 내부에 포함된다.
- (ii) 가로는 x 축과 평행하고 세로는 y 축과 평행하다.
- (iii) 곡선 C 위의 점 $(a, -a^2 + 6)$ 에 오른쪽 위 꼭짓점을 두고 있다.

다음 문항에 답하시오.

- (1) 직사각형 T 의 넓이 M 을 a 의 식으로 나타내시오.
- (2) 넓이 M 이 최대가 되는 실수 a 의 값을 구하시오.

/ 문 / 제 / 해 / 설 /

📖 문제 1

🔧 출제 의도

함수의 연속성 개념, 삼각함수의 주기성 및 여러 가지 적분법을 적용해 적분을 구하는 능력을 평가하는 문제이다.

🔧 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	수학 II - (1) 함수의 극한과 연속 - ② 함수의 연속 수학 II - (3) 적분 - ② 정적분 수학 I - (2) 삼각함수 - ① 삼각함수	
관련 성취기준	과목명: 수학 II	관련
	성취기준 1 [12수학 II 01-03] 함수의 연속의 뜻을 안다.	
	성취기준 2 [12수학 II 03-03] 정적분의 뜻을 안다.	
	과목명: 수학 I	관련
성취기준 1 [12수학 I 02-02] 삼각함수의 뜻을 알고, 사인함수, 코사인함수, 탄젠트함수의 그래프를 그릴 수 있다.		

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 II	고성은 외 6인	좋은책신사고	2018	30,123
	수학 II	박교식 외 19인	동아출판	2018	30,126
	수학 I	황선욱 외 8인	미래엔	2018	74
	수학 I	김원경 외 14인	비상교육	2019	71

🔧 문항 해설

주기함수 f 를 이용해 정의된 함수 g 가 연속이기 위한 상수의 조건을 구하고, 함수 g 의 정적분을 함수 f 와 삼각함수의 주기성 및 부분적분법과 치환적분법을 이용하여 구하는 문제이다.




채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	주기함수 f 를 이용해 정의된 함수 g 가 연속이기 위한 상수 a 의 조건을 구한다	9
(2)	함수 g 의 정적분을 함수 f 와 삼각함수의 주기성 및 부분적분법과 치환적분법을 적용하여 구한다	21



예시 답안

(1) 함수 $f(x)$ 는 주기가 1인 주기함수이고 $0 \leq x < \frac{1}{2}$ 일 때 $2x + (a-1)$, $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ 일 때 $-2x + (a+1)$ 이므로 함수 $f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



또한 $f(0) = f(1) = a-1$ 이므로 $f(x)$ 는 실수 전체에서 연속이다.

함수 $g(x)$ 의 $x = k$ 에서의 함숫값은 $g(k) = \frac{f(k)}{(k+1)(k+2)} = \frac{a-1}{(k+1)(k+2)}$ 이다.

$x = k$ 에서의 좌극한은 함수의 극한의 성질과 $f(x)$ 의 연속성 ($\lim_{x \rightarrow k} f(x) = f(k)$)을 이용하여 다음과 같이 계산할 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow k^-} \frac{f(x)}{[x+1][x+2]} = \frac{\lim_{x \rightarrow k^-} f(x)}{\lim_{x \rightarrow k^-} [x+1][x+2]} = \frac{f(k)}{k(k+1)} = \frac{a-1}{k(k+1)}$$

비슷한 방법으로 $x = k$ 에서의 우극한을 다음과 같이 구한다.

$$\lim_{x \rightarrow k^+} \frac{f(x)}{[x+1][x+2]} = \frac{\lim_{x \rightarrow k^+} f(x)}{\lim_{x \rightarrow k^+} [x+1][x+2]} = \frac{f(k)}{(k+1)(k+2)} = \frac{a-1}{(k+1)(k+2)}$$

함수 $g(x)$ 가 $x = k$ 에서 연속이기 위해서는 함숫값과 좌극한 및 우극한이 모두 같아야 하므로 다음 식을 만족해야 한다.

$$\frac{a-1}{k(k+1)} = \frac{a-1}{(k+1)(k+2)}$$

따라서 $a = 1$ 이다.

(2) 문항 (1)에서 구한 $a = 1$ 을 대입하면 함수 $f(x)$ 는 $0 \leq x < \frac{1}{2}$ 일 때 $2x$, $\frac{1}{2} \leq x \leq 1$ 일 때 $-2x + 2$ 이다.

이때 정적분의 성질에 의하여 구하고자 하는 식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} & \int_0^n g(x) |\sin \pi x| dx \\ &= \int_0^1 \frac{f(x)}{1 \cdot 2} |\sin \pi x| dx + \int_1^2 \frac{f(x)}{2 \cdot 3} |\sin \pi x| dx + \cdots + \int_{n-1}^n \frac{f(x)}{n \cdot (n+1)} |\sin \pi x| dx \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \int_{k-1}^k f(x) |\sin \pi x| dx \end{aligned}$$

정적분 $\int_{k-1}^k f(x) |\sin \pi x| dx$ 를 구하기 위해 $t = x - (k-1)$ 로 놓고 치환적분법과 함수 $f(x)$ 의 주기성을 이용하면 다음 등식을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int_{k-1}^k f(x) |\sin \pi x| dx &= \int_0^1 f(t+k-1) |(-1)^{k-1} \sin \pi t| dt \\ &= \int_0^1 f(t) \sin \pi t dt \\ &= \int_0^{\frac{1}{2}} 2t \sin \pi t dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 (2-2t) \sin \pi t dt \end{aligned}$$

위 식의 두 번째 적분에서 $u = 1-t$ 로 치환하면

$$\int_{\frac{1}{2}}^1 (2-2t) \sin \pi t dt = \int_0^{\frac{1}{2}} 2u \sin \pi u du$$

이므로

$$\int_{k-1}^k f(x) |\sin \pi x| dx = \int_0^{\frac{1}{2}} 4t \sin \pi t dt$$

이다. 부분적분법을 이용하여 $\int_0^{\frac{1}{2}} 4t \sin \pi t dt$ 을 구하면

$$\int_0^{\frac{1}{2}} 4t \sin \pi t dt = \left[-4t \cdot \frac{1}{\pi} \cos \pi t \right]_0^{\frac{1}{2}} + \int_0^{\frac{1}{2}} 4 \cdot \frac{1}{\pi} \cos \pi t dt = \left[\frac{4}{\pi^2} \sin \pi t \right]_0^{\frac{1}{2}} = \frac{4}{\pi^2}$$

따라서 $\int_0^n g(x) |\sin \pi x| dx$ 은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} \int_0^n g(x) |\sin \pi x| dx &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \int_{k-1}^k f(x) |\sin \pi x| dx \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \cdot \frac{4}{\pi^2} \\ &= \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \frac{4}{\pi^2} \cdot \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

문제 2

출제 의도

도함수를 이용하여 접선의 방정식을 구하는 능력, 정적분의 활용하여 도형의 넓이를 구하는 능력 및 함수의 극한을 계산하는 능력을 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	수학Ⅱ - (1) 함수의 극한과 연속 - ① 함수의 극한 수학Ⅱ - (3) 적분 - ③ 정적분의 활용 미적분 - (2) 미분법 - ③ 도함수의 활용		
관련 성취기준	과목명: 수학Ⅱ		관련
	성취기준 1	[12수학Ⅱ 01-02] 함수의 극한에 대한 성질을 이해하고, 함수의 극한값을 구할 수 있다.	
	성취기준 2	[12수학Ⅱ 03-05] 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구할 수 있다.	
	과목명: 미적분학		관련
성취기준 1	[12미적02-11] 접선의 방정식을 구할 수 있다.		

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학 Ⅱ	고성은 외 6인	좋은책신사고	2018	19,133
	수학 Ⅱ	박교식 외 19인	동아출판	2018	19,137
	미적분	박교식 외 19인	동아출판	2019	101
	미적분	김원경 외 14인	비상교육	2019	96

문항 해설

도함수를 이용하여 접선의 방정식을 구하고, 곡선과 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 정적분을 활용하여 구한 후, 함수의 극한의 성질을 이용하여 극한값을 구하는 문제이다.

채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	접선 l 의 방정식을 구하고 곡선 C 와 접선 l 의 교점의 x 좌표를 구한다.	8
(2)	도형의 넓이 K, L 을 구하고, 극한값 $\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{K}{L}$ 을 구한다.	12



예시 답안

(1) 점 P 의 좌표를 $(t, t^3 + at)$ 라고 하자. 점 P 에서의 접선의 기울기는 $(3t^2 + a)$ 이므로 구하는 접선 ℓ 의 방정식은


$$y = (3t^2 + a)(x - t) + (t^3 + at) = (3t^2 + a)x - 2t^3$$

이다. 직선 ℓ 과 곡선 C 의 교점의 x 좌표는 다음 방정식을 만족한다.

$$(3t^2 + a)x - 2t^3 = x^3 + ax \Leftrightarrow (x - t)^2(x + 2t) = 0$$

따라서 점 Q 의 x 좌표는 $-2t$ 이고 선분 PQ 의 중점 R 의 x 좌표는 $b = -\frac{t}{2}$ 이다. 그러므로 점 P 의 x 좌표는 $-2b$, 점 Q 의 x 좌표는 $4b$ 이다.

(2) $b > 0$ 이면 접선 ℓ 은 곡선 C 와 그림과 같이 접한다.



접선 ℓ 의 방정식은

$$y = (12b^2 + a)x + 16b^3$$

이므로 두 도형의 넓이 K, L 은 다음과 같다.

$$K = \int_{-2b}^b (-x^3 + 12b^2x + 16b^3)dx = \left[-\frac{x^4}{4} + 6b^2x^2 + 16b^3x \right]_{-2b}^b = \frac{135}{4}b^4$$

$$L = \int_b^{4b} (-x^3 + 12b^2x + 16b^3)dx = \left[-\frac{x^4}{4} + 6b^2x^2 + 16b^3x \right]_b^{4b} = \frac{297}{4}b^4$$

따라서 구하는 극한값은 $\lim_{b \rightarrow \infty} \frac{K}{L} = \frac{135}{297} = \frac{5}{11}$ 이다.

문제 3

출제 의도

문제에서 주어진 확률변수를 이해하고, 확률의 덧셈정리와 곱셈정리를 활용하여 확률변수의 확률분포와 기댓값을 구하는 능력을 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	확률과 통계 - (2) 확률 - ① 확률의 뜻과 활용 확률과 통계 - (2) 확률 - ② 조건부확률 확률과 통계 - (3) 통계 - ① 확률분포		
관련 성취기준	과목명: 확률과 통계		관련
	성취기준 1	[12확통02-03] 확률의 덧셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	
	성취기준 2	[12확통02-07] 확률의 곱셈정리를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.	
	성취기준 3	[12확통03-01] 확률변수와 확률분포의 뜻을 안다.	

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	확률과 통계	김원경 외 14인	비상교육	2018	44,53,73
	확률과 통계	황선욱 외 9인	미래엔	2019	50,58,79

문항 해설

흰 구슬과 검은 구슬이 들어 있는 주머니에서 흰 구슬이 모두 나올 때까지 꺼낸 구슬의 총 개수로 정의된 확률변수 X 의 확률분포 및 기댓값을 구한다.


채점 기준

하위 문항	채점 기준	배점
(1)	확률 $P(X=5)$ 를 구한다.	6
(2)	확률변수 X 의 확률분포 및 기댓값 $E(X)$ 를 구한다.	9
(3)	확률변수 Y 의 확률분포 및 기댓값 $E(Y)$ 를 구한다.	15



예시 답안

(1) $X=5$ 이기 위해서는 다섯 번째 나오는 구슬이 흰 구슬이어야 한다. 각각의 경우를 그림으로 나타내면 다음과 같다.



따라서 구하는 확률은

$$P(X=5) = 4 \times \frac{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \frac{2}{5} = 0.4$$

이다.

(2) X 의 확률분포를 구하면 다음과 같다.

x	2	3	4	5
$P(X=x)$	$1 \times \frac{2 \cdot 1}{5 \cdot 4} = \frac{1}{10}$	$2 \times \frac{3 \cdot 2 \cdot 1}{5 \cdot 4 \cdot 3} = \frac{2}{10}$	$3 \times \frac{3 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 1}{5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2} = \frac{3}{10}$	$\frac{4}{10}$

따라서 확률변수 X 의 기댓값은 다음과 같다.

$$E(X) = 2 \cdot \frac{1}{10} + 3 \cdot \frac{2}{10} + 4 \cdot \frac{3}{10} + 5 \cdot \frac{4}{10} = 4$$

(3) 확률변수 Y 는 2부터 $n+2$ 까지의 값을 갖는다. 확률변수 Y 의 값이 y 이기 위해서는 두 번째 흰 구슬이 y 번째에 나와야 한다. 첫 번째 흰 구슬이 i 번째 ($i=1, 2, \dots, y-1$)에 나오고 두 번째 흰 구슬이 y 번째에 나올 확률은 모든 i 에 대해 동일하게

$$\frac{2 \cdot 1 \times n(n-1) \cdots (n-(y-3))}{(n+2)(n+1) \cdots (n+2-(y-1))} = \frac{2}{(n+1)(n+2)}$$

이므로

$$P(Y=y) = \frac{2(y-1)}{(n+1)(n+2)} \quad (y=2, 3, \dots, n+2)$$

이다.

따라서 확률변수 Y 의 기댓값은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} E(Y) &= \sum_{y=2}^{n+2} y \cdot \frac{2(y-1)}{(n+1)(n+2)} = \frac{2}{(n+1)(n+2)} \sum_{y=1}^{n+1} y(y+1) \\ &= \frac{2}{(n+1)(n+2)} \left(\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} + \frac{(n+1)(n+2)}{2} \right) \\ &= \frac{2}{3}n + 2 \end{aligned}$$

문제 4

출제 의도

주어진 조건을 만족하는 도형의 넓이를 식으로 표현하는 능력, 도함수를 활용하여 함수의 최대, 최소를 구하는 능력을 평가한다.

출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

적용 교육과정	수학 - (1) 문자와 식 - ⑤ 이차방정식과 이차함수 수학Ⅱ - (2) 미분 - ③ 도함수의 활용		
관련 성취기준	과목명: 수학		관련
	성취기준 1	[10수학01-11] 이차함수의 최대, 최소를 이해하고, 이를 활용하여 문제를 해결할 수 있다.	
	과목명: 수학Ⅱ		관련
	성취기준 1	[12수학Ⅱ02-08] 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.	

나) 자료 출처

참고자료	도서명	저자	발행처	발행년도	쪽수
고등학교 교과서	수학	류희찬 외 10인	천재교과서	2018	70
	수학	김원경 외 14인	비상교육	2018	63
	수학Ⅱ	박교식 외 19인	동아출판	2018	81
	수학Ⅱ	김원경 외 14인	비상교육	2018	78

문항 해설

꼭짓점이 이차함수 및 직선에 놓인 직사각형의 최대 넓이를 a 의 식으로 표현하고, 함수의 증감을 이용하여 그 식이 최대가 되는 실수 a 의 값을 구하는 문제이다.

채점 기준


하위 문항	채점 기준	배점
(1)	직사각형 T 의 넓이 M 을 a 의 식으로 나타낸다.	14
(2)	넓이 M 이 최대가 되는 실수 a 의 값을 구한다.	6



예시 답안

- (1) (i) S 의 내부에 포함된다.
 (ii) 가로는 x 축과 평행하고 세로는 y 축과 평행하다.
 (iii) 곡선 C 위의 점 $(a, -a^2 + 6)$ 에 오른쪽 위 꼭짓점을 두고 있다.

위 조건을 모두 만족하는 직사각형의 넓이가 최대가 되기 위해서는 아래 그림과 같이 직사각형의 왼쪽 아래 꼭짓점이 직선 $\ell: 2x + y = 6$ 위에 놓여야 한다. 또한 곡선 C 와 직선 ℓ 의 교점의 x 좌표는 $x = 0, 2$ 이므로, a 의 범위는 $0 < a < 2$ 이다.



왼쪽 아래 꼭짓점이 $(x, -2x + 6)$ 이고 오른쪽 위 꼭짓점이 $(a, -a^2 + 6)$ 인 직사각형의 넓이를 $f(x)$ 라고 하자. 왼쪽 아래 꼭짓점의 x, y 좌표는 오른쪽 위 꼭짓점의 x, y 좌표보다 작아야 하므로 $\frac{1}{2}a^2 < x < a$ 을 만족해야 한다. 이 직사각형의 가로와 세로의 길이는 각각 $a - x$ 와 $-a^2 + 6 - (-2x + 6) = -a^2 + 2x$ 이므로 직사각형의 넓이는 다음과 같다.

$$f(x) = (a - x)(-a^2 + 2x) = -2x^2 + (a^2 + 2a)x - a^3 = -2\left(x - \frac{a^2 + 2a}{4}\right)^2 + \frac{a^4 - 4a^3 + 4a^2}{8}$$

$0 < a < 2$ 에서 $\frac{1}{2}a^2 < \frac{a^2 + 2a}{4} < a$ 이므로 $f(x)$ 는 $x = \frac{a^2 + 2a}{4}$ 일 때 최대가 되고 이때의 최댓값이 직사각형 T 의 넓이

$$M = \frac{1}{8}a^4 - \frac{1}{2}a^3 + \frac{1}{2}a^2$$

이다.

(2) $M = M(a) = \frac{1}{8}a^4 - \frac{1}{2}a^3 + \frac{1}{2}a^2$ 의 a 에 대한 도함수

$$M'(a) = \frac{1}{2}a^3 - \frac{3}{2}a^2 + a = \frac{1}{2}a(a-1)(a-2)$$

는 $0 < a < 2$ 일 때 $a = 1$ 에서 0이므로 M 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

a	0	...	1	...	2
$M'(a)$		+	0	-	
$M(a)$		↗	$\frac{1}{8}$	↘	

따라서 $a = 1$ 일 때 $M(1) = \frac{1}{8}$ 로 최대가 된다.